

160.00 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA


Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Carreras N° 2226 Urb. Oyague
Jesus Maria - Lima - Perú



Formulador:

Nippon Kayaku Co., Ltd.
1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan



Importador y Distribuidor:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf: 710-4068



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 0.25 kg

Fecha de vencimiento:

@Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

160.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Al comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y défiese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la nerisstroina
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, láveselos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12.5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 CIPROQUIM: 080-000-0417 Arysta LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la tunda o bolsa cotidianita. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (estancia natural presente en ciertos anélidos marinos: Lumbricoides sp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del cuerpo de la hoja. Lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores. Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta premezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	%		
Al. Pimiento	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
	Gusano defoliador	Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
Algodón	Perforador de la hoja	Bucculatrix thurberiella	0.5	0.1	15	0.02
	Gusano mayor de la hoja	Alabama argillacea	0.5	0.1	0.05	N.D.
	Gusano menor de la hoja	Anastrepha toana	0.5	0.1	0.05	N.D.
Cebolla	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.
	Gusano defoliador	Heliothis virescens	0.20-0.40	0.10-0.20	N.D.	3
	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.20-0.40	0.10-0.20	N.D.	3
Espinazo	Gusano defoliador	Coplatarsia turbuta	0.1	0.1	0.05	N.D.
	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.
	Tripsa del tallo	Heliothis virescens	0.1	0.1	0.05	N.D.
Papa	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.
	Tripsa del tallo	Heliothis virescens	0.1	0.1	0.05	N.D.
	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.
Tomate	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.
	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.
	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.
Vid	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.
	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.
	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.
Papa	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.
	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.
	Tripsa	Tripsa tabaci	0.1	0.1	0.05	N.D.

LMR: Límite máximo de residuo

P.C.: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT®-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón debe efectuarse con estadíos larvales 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas estén afectadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadíos larvales 1 y 2.

PERÍODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: EVISECT®-S La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto descrito en este envase, corresponden a las ancladas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

