

# EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

## Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg

Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

## Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.

Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague

Jesús María - Lima - Perú



Innovation. Agility. Results.

## Formulado por:

Nippon Kayaku Co., Ltd.

1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,

Tokyo, Japón



## Importado y Distribuido por:

SERFI S.A.

Av. República de Panamá 2577

La Victoria - Lima - Perú

Telf. 710-4000



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: **40 kg**

Fecha de vencimiento:

@Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la nereistoxina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:  
**CICOTOX:** 0800-1-3040, 328-7700 **ESSALUD:** 411-8000 Anexo 4  
**INFOSALUD:** 0800-10-828

**Antídoto:** Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No utilice este envase para almacenar alimentos o agua.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**EVISECT®-S** es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris spp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.

Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente., agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos **EVISECT®-S** debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo.

La aplicación en el cultivo de algodón debe efectuarse con estadios larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectados.

En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadios larvarios 1 y 2.

### PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

**EVISECT®-S** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

### FITOTOXICIDAD

**EVISECT®-S** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

### CUADRO DE USO

| CULTIVO       | PLAGA                   |                                    | DOSIS     |           |           | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|               | Nombre común            | Nombre científico                  | Kg/ha     | Kg/cil    | %         |              |              |
| Aji, Pimiento | Gusano perforador       | <i>Heliothis virescens</i>         | 0.30-0.40 | 0.15-0.20 | -----     | N.D.         | 3            |
|               | Mosca minadora          | <i>Liriomyza huidobrensis</i>      |           |           |           |              |              |
| Alcachofa     | Gusano defoliador       | <i>Heliothis virescens</i>         | 0.30-0.40 | 0.15-0.20 | -----     | N.D.         | 3            |
|               | Perforador de la hoja   | <i>Bucculatrix thurberiella</i>    |           |           |           |              |              |
| Algodón       | Gusano mayor de la hoja | <i>Alabama argillacea</i>          | 0.5       | -----     | -----     | 15           | 0.02         |
|               | Gusano menor de la hoja | <i>Anomis texana</i>               |           |           |           |              |              |
| Cebolla       | Thrips                  | <i>Thrips tabaci</i>               | -----     | 0.1       | 0.05      | N.D.         | 3            |
| Espárrago     | Gusano defoliador       | <i>Heliothis virescens</i>         | 0.20-0.40 | 0.10-0.20 | -----     | N.D.         | 3            |
|               | Gusano cogollero        | <i>Spodoptera frugiperda</i>       |           |           |           |              |              |
|               | Gusano defoliador       | <i>Copitarsia turbata</i>          |           |           |           |              |              |
|               | Thrips                  | <i>Thrips tabaci</i>               |           |           |           |              |              |
| Granado       | Thrips                  | <i>Thrips tabaci</i>               | -----     | 0.15-0.20 | 0.075-0.1 | 14           | 3            |
| Palto         | Thrips del palto        | <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> | -----     | 0.1       | 0.05      | N.D.         | 3            |
| Tomate        | Polilla                 | <i>Tuta absoluta</i>               | 0.70      | 0.35      | -----     | 15           | 3            |
|               | Mosca blanca            | <i>Bemisia tabaci</i>              | 0.30-0.40 | 0.15-0.20 |           |              |              |
| Vid           | Thrips                  | <i>Thrips tabaci</i>               | -----     | 0.1       | 0.05      | 14           | 3            |
| Papa          | Polilla de la papa      | <i>Phthorimaea operculella</i>     | 0.60      | -----     | -----     | N.D.         | 0.01         |
|               | Thrips                  | <i>Thrips tabaci</i>               | 0.20-0.30 | -----     | -----     | N.D.         | 0.01         |

P.C.: Periodo de Carenacia

N.D.: No determinado

LMR: Límite máximo de residuo

