

MEDIDAS: 14CM X 15.8CM
ABRIL 2016
ML

TIRA

PANTONE YELLOW C

REGLAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato.....	20.0 g/L
Abamectina.....	20.0 g/L
Aditivos.....	csp 1 L

Reg. PQUA N° 1371 - SENASA

Titular del registro:

MONTANA S.A.

Formulador y Distribuidor: MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210, Oficina 401, La Molina. Lima - Perú.

Teléfonos: (511) 4193000

E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 5 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

MONTANA

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

RETIRA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ## PRIMEROS AUXILIOS

- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 20 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

P.C.: Período de carencia (días).

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (PPM: partes por millón).

N.A.: No Aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al inicio de las infestaciones previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga.
- Se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 días y luego rotar con insecticidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre toda la planta.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

REGLAN es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Evitar ser mezclado con compuestos altamente reactivos como ácidos y bases fuertes o agentes oxidantes fuertes. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

FITOTOXICIDAD

REGLAN no es fitotóxico usado a las dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

