

**LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE LOS
NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- Causa irritación moderada a los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilurinas + Triazoles.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICTOX: 0800 13040 ESSALUD: 0801 10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin". Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

COUGAR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin200 g/L
Cyproconazole80 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 1544 - SENASA

Titular del Registro:

UNITED PHOSPHORUS PERU S.A.C.
Calle Los tulipanes N° 147, Of. 304, Surco,
Lima 33 - Perú. Telf.: +511 7194085



Formulador:

UPL Limited. Mailing: Uniphos House, Madhu Park,
Khar (West), Mumbai-400 52, Maharashtra (India)

Importado y Distribuido por:

FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27-PERU
Teléfono: (511) 630-6400
www.farmex.com.pe



CONTENIDO NETO:

No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

500 ml

**"VER PARTE
SUPERIOR"**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

COUGAR es un fungicida de amplio espectro que se aplica para el control de "chupadera fungosa" *Rhizoctonia solani* en el cultivo de arroz.

COUGAR se aplica a la aparición de los primeros síntomas. Si hay amenaza de lluvia evitar la aplicación

CONSULTE CON INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis L/ha	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.4	7	5' 0.08"

1. Azoxystrobin
2. Cyproconazole

P.C. Periodo de carencia en días

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: La aplicación se realiza aproximadamente a los 20 días después del trasplante, cuando el cultivo se encuentra en fase de macollamiento.

PERIODO DE REINGRESO: Ingresar al campo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **COUGAR** es compatible con la mayoría de productos de uso común en arroz.

FITOTOXICIDAD: No se han observado síntomas de fitotoxicidad si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

