

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** Amonio cuaternario

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los usara y seguir enjuagándolos.

**Nota al Médico:** No hay antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

**Teléfonos de emergencia**

**CICOTOX:** 0800-1-3040

**Aló EsSalud:** 472-2300 (emergencias 24 horas)

**CISPROQUIM:** 0800-050-847

# Quimix® 50 SL

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**Composición:**

Cloruro de Mepiquat..... 50 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. RCP N° -SENASA

Titular del Registro:



QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.



**Formulado por:**

SERFI S.A.  
Av. Diagonal 380, Ofc. 701  
Miraflores.  
Lima-Perú

**Contenido Neto: 0.5 L**

Lote:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

**Distribuido por:**

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.  
Av. República de Panamá 2577.  
La Victoria, Lima-Perú  
Telf.: 710-4000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

• **Quimix® 50 SL** actúa inhibiendo la biosíntesis del Acido Giberélico, evitando de esta manera el enclavamiento de la planta producido por un exceso de fertilización, temperatura y/o humedad.

• **Quimix® 50 SL** se usa en pulverización sobre el follaje. Se puede aplicar con equipo de pulverización manual o tractor, con un volumen de agua que cubra bien a la planta.

• Para preparar la solución de aplicación se deberá colocar un poco de agua en un envase, y luego agregar la cantidad de producto que se va a aplicar. Es necesario calibrar el equipo de aplicación, así como el volumen de agua.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	L/ cil200 L	L/ha		
Algodón	0.5 - 1	1.0 - 1.5	30	5
Frijol	0.5	0.9	30	0.05

PC: Periodo de Carencia / LMR: Limite Máximo de Residuos

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

