0.50 cm 21.000 centímetros 0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

0.50 centímetros

30.00 centímetros

0.50 cm

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Herbacil®
700 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:
Metribuzin.....700 g/kg
Aditivos.....c.s.p..... 1 kg

Reg. PQUA N° 144-SENASA

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Formulado por:
NANJING ESSENCE FINE CHEMICALS CO LTD.
N° 58, Nanhu Road,Nanjing, China.
P.C: 210007.

Importado y distribuido por:

Farmex

Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 2 kg

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca registrada de Farmex S.A.

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

0.50 cm

0.50 cm

0.50 cm 21.000 centímetros 0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

0.50 centímetros

30.00 centímetros

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Peligroso si es inhalado. Evite aspirar el polvo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Triazinonas.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, remueva la ropa contaminada. Lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente al aire fresco. Si es necesario de respiración artificial.
- En caso de ingestión, administre grandes cantidades de agua. Induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta hasta que el vómito salga claro. No induzca al vómito si el paciente está inconsciente. Llame al médico.

Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para las abejas. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar su uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
HERBACIL® 700 WG es un herbicida sistémico, selectivo, preemergente y postemergente temprano para el control de malezas anuales gramíneas y de hoja ancha en los cultivos indicados en el cuadro de usos. **HERBACIL® 700 WG** actúa inhibiendo la fotosíntesis. Es absorbido principalmente por las raíces, pero también por las hojas, y es traslocado por el xilema. Añada el producto **HERBACIL® 700 WG** en un pequeño volumen de agua. Forme una pasta cremosa removiendo constantemente. Vacié esta pasta al volumen de agua necesario para la dilución recomendada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS			DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	TIPO DE MALEZAS	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/cil	g/ha		
Espárrago	Malezas gramíneas	Pata de gallina Coquito Rabo de zorro Grama china Cadillo Moco de pavo	*Eleusine indica* *Cyperus rotundus* *Setaria geniculata* *Sorghum halepense* *Cenchrus echinatus* *Echinochloa crus-galli /* *Echinochloa cruspavonis*	100	150	21	0.1
Papa				150	---	60	0.1
Capsicum annuum	Malezas de hoja ancha	Yuyo hembra Yuyo macho Verdolaga Amor seco Campanilla Lechera Chamico Cerraja Hierba gallinazo Capulí	*Amaranthus hybridus* *Amaranthus caudatus* *Portulaca oleracea* *Bidens pilosa* *Ipomoea purpurea* *Euphorbia heterophylla* *Datura stramonium* *Sonchus oleraceus* *Chenopodium murale* *Nicandra physaloides*	150	---	60	0.1

PC: Período de carencia. **LMR:** Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En preemergencia: aplicar sobre el suelo antes de la emergencia de las malezas y con el cultivo ya instalado. En postemergencia temprana: aplicar en malezas ya emergidas con no más de 4 hojas. En el caso de espárrago no se recomienda aplicar en cultivos establecidos después de la emergencia de los turiones. Realizar las aplicaciones con terreno regado y ligeramente oreado. En todos los cultivos recomendados el número máximo de aplicaciones es de 2 aplicaciones/campaña considerando solo 1 campaña/año.
PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto en mezclas altamente concentradas.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y forma de aplicación recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Versión 03

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

0.50 cm 0.50 cm

0.50 cm 21.000 centímetros 0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

0.50 centímetros

30.00 centímetros

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Herbacil®
700 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:
Metribuzin.....700 g/kg
Aditivos.....c.s.p..... 1 kg

Reg. PQUA N° 144-SENASA

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.,
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District,
Shanghai, China - Postcode: 201619,
Teléfono: +86-21-51698968
Fax: +86-21-57697799

Importado y distribuido por:

Farmex

Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 2 kg

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca registrada de Farmex S.A.

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

0.50 cm

0.50 cm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

0.50 cm 21.000 centímetros 0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

0.50 centímetros

30.00 centímetros

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Peligroso si es inhalado. Evite aspirar el polvo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Triazinonas.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, remueva la ropa contaminada. Lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente al aire fresco. Si es necesario de respiración artificial.
- En caso de ingestión, administre grandes cantidades de agua. Induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta hasta que el vómito salga claro. No induzca al vómito si el paciente está inconsciente. Llame al médico.

Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para las abejas. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar su uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
HERBACIL® 700 WG es un herbicida sistémico, selectivo, preemergente y postemergente temprano para el control de malezas anuales gramíneas y de hoja ancha en los cultivos indicados en el cuadro de usos. **HERBACIL® 700 WG** actúa inhibiendo la fotosíntesis. Es absorbido principalmente por las raíces, pero también por las hojas, y es traslocado por el xilema. Añada el producto **HERBACIL® 700 WG** en un pequeño volumen de agua. Forme una pasta cremosa removiendo constantemente. Vacié esta pasta al volumen de agua necesario para la dilución recomendada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS			DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	TIPO DE MALEZAS	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/cil	g/ha		
Espárrago	Malezas gramíneas	Pata de gallina Coquito Rabo de zorro Grama china Cadillo Moco de pavo	*Eleusine indica* *Cyperus rotundus* *Setaria geniculata* *Sorghum halepense* *Cenchrus echinatus* *Echinochloa crus-galli /* *Echinochloa cruspavonis*	100	150	21	0.1
Papa				150	---	60	0.1
Capsicum annuum	Malezas de hoja ancha	Yuyo hembra Yuyo macho Verdolaga Amor seco Campanilla Lechera Chamico Cerraja Hierba gallinazo Capulí	*Amaranthus hybridus* *Amaranthus caudatus* *Portulaca oleracea* *Bidens pilosa* *Ipomoea purpurea* *Euphorbia heterophylla* *Datura stramonium* *Sonchus oleraceus* *Chenopodium murale* *Nicandra physaloides*	150	---	60	0.1

PC: Período de carencia. **LMR:** Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En preemergencia: aplicar sobre el suelo antes de la emergencia de las malezas y con el cultivo ya instalado. En postemergencia temprana: aplicar en malezas ya emergidas con no más de 4 hojas. En el caso de espárrago no se recomienda aplicar en cultivos establecidos después de la emergencia de los turiones. Realizar las aplicaciones con terreno regado y ligeramente oreado. En todos los cultivos recomendados el número máximo de aplicaciones es de 2 aplicaciones/campaña considerando solo 1 campaña/año.
PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto en mezclas altamente concentradas.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y forma de aplicación recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Versión 03

0.50 cm

0.50 cm

0.50 cm 21.000 centímetros 0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

0.50 centímetros

30.00 centímetros

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Herbacil®
700 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:
Metribuzin.....700 g/kg
Aditivos.....c.s.p..... 1 kg

Reg. PQUA N° 144-SENASA

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Formulado por:
SULPHUR MILLS LIMITED
604/605,349 Business Point
Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai, India.
Teléfono: +91-22-4345 2222
Fax: +91-22-43452245 / 2682 3716

Importado y distribuido por:

Farmex

Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 2 kg

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca registrada de Farmex S.A.

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

0.50 cm

0.50 cm

0.50 cm 21.000 centímetros 0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

0.50 centímetros

30.00 centímetros

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Peligroso si es inhalado. Evite aspirar el polvo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Triazinonas.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, remueva la ropa contaminada. Lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente al aire fresco. Si es necesario de respiración artificial.
- En caso de ingestión, administre grandes cantidades de agua. Induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta hasta que el vómito salga claro. No induzca al vómito si el paciente está inconsciente. Llame al médico.

Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para las abejas. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar su uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
HERBACIL® 700 WG es un herbicida sistémico, selectivo, preemergente y postemergente temprano para el control de malezas anuales gramíneas y de hoja ancha en los cultivos indicados en el cuadro de usos. **HERBACIL® 700 WG** actúa inhibiendo la fotosíntesis. Es absorbido principalmente por las raíces, pero también por las hojas, y es traslocado por el xilema. Añada el producto **HERBACIL® 700 WG** en un pequeño volumen de agua. Forme una pasta cremosa removiendo constantemente. Vacié esta pasta al volumen de agua necesario para la dilución recomendada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS			DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	TIPO DE MALEZAS	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/cil	g/ha		
Espárrago	Malezas gramíneas	Pata de gallina Coquito Rabo de zorro Grama china Cadillo Moco de pavo	*Eleusine indica* *Cyperus rotundus* *Setaria geniculata* *Sorghum halepense* *Cenchrus echinatus* *Echinochloa crus-galli /* *Echinochloa cruspavonis*	100	150	21	0.1
Papa				150	---	60	0.1
Capsicum annuum	Malezas de hoja ancha	Yuyo hembra Yuyo macho Verdolaga Amor seco Campanilla Lechera Chamico Cerraja Hierba gallinazo Capulí	*Amaranthus hybridus* *Amaranthus caudatus* *Portulaca oleracea* *Bidens pilosa* *Ipomoea purpurea* *Euphorbia heterophylla* *Datura stramonium* *Sonchus oleraceus* *Chenopodium murale* *Nicandra physaloides*	150	---	60	0.1

PC: Período de carencia. **LMR:** Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En preemergencia: aplicar sobre el suelo antes de la emergencia de las malezas y con el cultivo ya instalado. En postemergencia temprana: aplicar en malezas ya emergidas con no más de 4 hojas. En el caso de espárrago no se recomienda aplicar en cultivos establecidos después de la emergencia de los turiones. Realizar las aplicaciones con terreno regado y ligeramente oreado. En todos los cultivos recomendados el número máximo de aplicaciones es de 2 aplicaciones/campaña considerando solo 1 campaña/año.
PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto en mezclas altamente concentradas.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y forma de aplicación recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Versión 03

0.50 cm

0.50 cm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA