



Folicur[®]

250 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Emulsión Aceite en agua (EW)

Composición:

Tebuconazole, 250 g/l
Aditivos, csp 1 litro

Reg.Nro:460-97-AG-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:

Bayer S.A.
Av. Américas 57-52
Bogotá DC - Colombia

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro Lima-Perú
Telf. 211-3800

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

Contenido Neto: 5L

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

®=Marca Registrada del grupo Bayer

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

-Durante la aplicación usar máscara y guantes protectores, no comer, beber ni fumar.

-Terminada la labor, lavarse y cambiarse de ropa. Mantener alejados a los niños y animales domésticos del lugar de la aplicación.

-No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca. No verter los restos de la mezcla sobre cultivos útiles (alimenticios, forrajeros) y fuentes de agua (lagos, ríos, estanque, acequias) para evitar su contaminación.

-Usarlo sólo de sus envases originales y almacenarlos herméticamente cerrados en lugares frescos y ventilados, cerrados bajo llave, lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

-No se debe almacenar ni transportar junto con productos alimenticios, (frescos o en conservas), medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Triazoles

-Si se presentaran síntomas de intoxicación, acudir de inmediato al médico.

-Entretanto, cambiar de ropa al paciente, lavar las partes expuestas al contacto con el producto; hacerlo reposar en un ambiente fresco. Si la intoxicación es por ingestión provocar el vómito.

-Hacer un lavado gástrico con una suspensión de carbón medicinal (2-3 cucharadas en medio litro de agua).

Indicación para el médico:

El médico instituirá un tratamiento sintomático.

Antídoto:

No se ha determinado un antídoto específico.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX: 0800-1-3040 **CISPROQUIM:** 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del envase, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reensavar o depositar el contenido en otros envases.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.

-Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

-Follicur 250 EV, es un fungicida sistémico del grupo de los Triazoles con acción preventiva, curativa y erradicativa.

-Forma de empleo: se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua.

USO ESPECÍFICO:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad	Agente Causal	DOSIS			PC* (días)	LMR** (ppm)
			l/ha	%	ml/cil		
Arroz	Quemado	Piricularia oryzae	1	0.2 - 0.3	400-600	35	1
			con atomizadora de mochila de 12 litros				
Cebada	Roya de la hoja	Puccinia hordei	0.5-0.75	-	-	35	0.2
Cítricos	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.1	200	21	0.9
Naranja	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.1	200	14	0.15
Cucurbitáceas	Oidiois	Erysiphe cichoracearum	-	0.04	80		
Melón	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.1	200	14	0.15
Sandia	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.1	200	14	0.15
Zapallo	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.1	200	14	0.15
Fresa	Oidiois	Oidium sp.	-	0.04	80	5	0.02
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.1	200		
Frijol	Oidiois	Erysiphe polygoni	0.75-1	0.02-0.04	40-80	21	0.1
Frijol	Roya	Uromyces appendiculatus	0.5 - 0.75	0.05-0.075	100-150		
Vainita	Roya	Uromyces appendiculatus	0.5 - 0.75	0.05-0.075	100-150		
Manzano	Oidiois	Podosphaera leucotricha	-	0.04	80	14	0.05
Melocoton	Oidiois	Sphaerotheca pannosa	-	0.05	100	21	0.6
Ornamentales	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.1	200	N.a	N.a
Clavel	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.1	200	N.a	N.a
Vid	Oidiois	Uncinula necator	-	0.03	60-200	21	2
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.1	200	21	2
Espárrago	Roya	Puccinia asparagi	0.5	0.05	100	30	0.01
Pimiento	Oidiois	Leveillula taurica	0.5	0.1-0.125	200-250	14	0.5

*PC = Período de Carencia **LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm) N.a = no aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar el producto como máximo 02 aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año, previa evaluación de la presencia de la enfermedad, rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD: Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

