| | | |
|---|---|---|
| neoagrum asegura tu cosecha | **ETIQUETA** | **Revisión: 01** |
| | **SEGURITE 625 WG - SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED** | **Aprobado: JR**<br>**Fecha: 14-12-17**<br>**Página: 1 de 4** |

11.0 ± 0.1 cm

16.0 ± 0.1 cm

# SEGURITE® 625 WG

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES - WG**

**COMPOSICIÓN:**

Cyprodinil ..... 375 g/kg
Fludioxonil ..... 250 g/kg
Aditivos ..... c.s.p 1 kg

**Reg. PQUA N° 1556 - SENASA**
**Titular del Registro, Importado y Distribuido por:**
**NEOAGRUM S.A.C.**

neoagrum

**Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla**
**Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400**

**Contenido neto: 100 g**
F. de Form.:
Nº de Lote:
F. de Venc.:

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing
CHINA

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

2.4 cm

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- No almacenar en casa o dentro de la habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Cyprodinil: Anilinopirimidas; Fludioxonil: Fenilpirrol
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos,lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabon.
- En caso de inhalación, colocar a la victima en una zona ventilada. Aplicar respiraciónartificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX: 328-7700**
**ESSALUD: 411-8000 (opción 4)**
**CISPROQUIM: 0800-50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacios.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evite el uso de productos en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**SEGURITE®625 WG** es un fungicida agrícola, sistémico y de contacto, que se recomienda para el control de Botriytis en el cultivo de granado.

**SEGURITE®625 WG** está compuesto por Cyprodinil, que actúa en la biosíntesis de metionina y la secreción de enzimas hidrolíticas; en mezcla con Fludioxonil, que inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento de los tubos germinales y micelio en la superficie de los tejidos afectados.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar **SEGURITE® 625 WG** al inicio de la infección del hongo, alternar las aplicaciones con fungicidas de diferentes modos de acción y realizar un maximo de 1 aplicacion por ciclo de cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:**
**SEGURITE® 625 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**
**SEGURITE® 625 WG** no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | DOSIS | P.C. | L.M.R (ppm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | kg/ha | kg/200L | (días) | (a) | (b) |
| Arándano | Moho gris | *Botrytis cinerea* | 0.6-0.8 | | 2 | 3.0 | 2.0 |
| Granado | Moho gris | *Botrytis cinerea* | 1.0-1.5 | | 7 | 0.01 | 0.01 |
| Vid | Pudrición gris | *Botrytis cinerea* | 1.0-1.2 | | 7 | 3.0 | 5.0 |

P.C.: Período de carencia (días). L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón).
(a) Cyprodinil (b) Fludioxonil

| LOGO NEOAGRUM | | | TEXTO | B.TOXICOLOGICA | LOGO PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|
| PANT. 343 C | PANT. 377 C | PANT. 1375 C | NEGRO | PANT. 293 C | PANT 355 C |

**CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE**