

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
CELTHA 247 SC brinda un excelente control sobre los chinches con efectivo poder residual. Actúa en dos puntos distintos del metabolismo del sistema nervioso de los insectos: los receptores de acetilcolina de las sinapsis y en los canales de sodio de las membranas, y resulta en una rápida pérdida de control muscular, parálisis y muerte.

CELTHA 247 SC se aplica en forma de aspersión foliar cuando la plaga se encuentre presente, sobrepasando el umbral de daño económico.

CELTHA 247 SC se puede aplicar desde el periodo vegetativo del cultivo. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
Arroz	Chinche del Arroz	<i>Oebalus poecillus</i>	0.1	0.125	21	0.6 (1) 1.0 (2)
Pimiento	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.15	—	5	0.7 (1) 0.1 (2)
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	—	0.25	7	0.01(1) 0.2 (2)
Palto	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1	—	7	0.5 (1) 0.02 (2)
Espárrago	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.15	—	7	0.01(1) 0.02(2)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) **P.C.:** Periodo de carencia (días)
(1) = Thiamethoxam
(2) = Lambda cyhalothrin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Para los cultivos de arroz y palto, se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, 1 campaña por año. Para los cultivos de pimiento, cebolla y espárrago se recomienda 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este periodo..

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de plaguicidas a excepción de ácidos y álcalis fuertes. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD:
CELTHA 247 SC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

CELTHA 247 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:
Thiamethoxam.....141.0 g/L
Lambda cyhalothrin.....106.0 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA Nº 1196 - SENASA

Thiamethoxam
Grupo químico: Neonicotinoide
Nombre común: Thiamethoxam
Nombre químico (IUPAC): (EZ)-3-(2 – chloro – 1, 3 – thiazol – 5 – yl)methyl – 5 – methyl – 1,3,5 – oxadiazinan – 4 – ylidene (nitro)amine
Fórmula Empírica: C8H10ClN5O3S
Peso molecular: 291.71 g/mol
Fórmula estructural:



Lambda cyhalothrin
Grupo químico: Piretroide
Nombre común: Lambda Cyhalothrin
Nombre químico (IUPAC): (R)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1S) – cis – 3 - [(Z) – 2 – chloro – 3, 3 - trifluoropropenyl] – 2, 2 - dimethylcyclopropanecarboxylate and (S) – a – cyano – 3 – phenoxybenzyl (1R) – cis – 3 - [(Z) – 2 – chloro – 3, 3 - trifluoropropenyl] – 2, 2 - dimethylcyclopropanecarboxylate
Fórmula Empírica: C23H19ClF3NO3
Peso molecular: 449.85 g/mol
Fórmula estructural:

