21.5 cm

27.5 cm

SUNTAZIM PLUS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

Gránulos dispersables (WG)

Composición:

Atrazine	900 g/kg
Aditivos	csp 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del registro e importador:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC
Av. El Polo N° 401 Of. 610.
Santiago de Surco. Lima- Perú.
Teléfono: 511 713-9960

Formulador:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
6th Floor, Gaoxinjisshuchuangye Centre Shunhua Road 750#,
Jinan, Shandong- China.
Teléfono: 86-531-88875222, Fax: 86-531-88875232

Contenido Neto: 5 Kg

Lote Nº:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

21.5 cm

27.5 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- **Grupos químico: Triazine**
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Llevar al afectado inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua no menos de 10 minutos.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Trasladar al paciente al medico especialista (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación y conducirlo al médico.

Nota al médico
- **Antídoto:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX : 0800-13-040
ESSALUD: 0801 - 10200 (línea gratuita)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.
- Peligroso para organismos acuáticos, algas, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua por lo menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

GENERALIDADES
SUNTAZIM PLUS es un herbicida sistémico y de contacto, tiene la característica de ser absorbido por las raíces y en menor proporción en hojas. Presenta translocación acropétala por el xilema, y se acumula en los tejidos fotosintéticos y puntos meristemáticos.

Preparación y aplicación:
1. Mezclar la dosis recomendada con un poco de agua en un recipiente hasta lograr una suspensión uniforme. Luego, vaciar el contenido en la mochila, cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la cantidad total requerida.
2. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
3-La absorción de **SUNTAZIM PLUS** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda como máximo dos aplicaciones por campaña/ año, considerando una campaña de maíz por año.

PERIODO DE REINGRESO
Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 12 horas.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Nombre de la plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha		
Maíz	Amor seco	*Bidens pilosa*	0.4-0.5	60	0.1
	Coquito	*Cyperus rotundus*			
	Grama china	*Sorghum halepense*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Yuyo	*Amaranthus dubius*			

PC: Periodo de carencia L.M.R: Limite máximo de residuos