Botella gemela - Derecha 16/07/2024

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

-No limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de las partes del equipo.

-Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.

-No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.

-Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.

-Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.

-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

LAOJITA SC debe guardarse en un lugar fresco y seco. En almacenamientos prolongados el producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 30°C.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-En caso de contaminación de los ojos con la solución concentrada, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

-En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

-En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, entre otros, llevar al paciente al médico mas cercano.

-Provoque el vómito en caso de ingestión y consiga ayuda médica.

-En caso de emergencia toxicológica llamar:

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
Titular GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO.: +51 (01) 2663828 ó SAMU: 106

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plagas: Nombre común	Plagas: Nombre científico	Dosis: L/Ha	Dosis: L/200L	PC	LMR
Algodón	Gusano de la bellota	*Helicoverpa zea*	1.05 - 1.2	0.7 - 0.8	N.A.	N.A.
	Gusano perforador de los frutos	*Cryptophlebia sp.*	3.0 - 3.84	1.0 - 1.2	N.A.	N.A.
Arándano	Gusano de la bellota	*Helicoverpa zea*	1.12 - 2.38	0.6 - 0.7	N.A.	N.A.
Camote	Caballada	*Spodoptera eridania*	1.75 - 2.0	0.7 - 0.8	N.A.	N.A.
Espárrago	Gusano de la bellota	*Heliothis virescens*	2.5 - 3.0	-	N.A.	N.A.
	Gusano ejercito	*Spodoptera frugiperda*	-	0.5 - 0.8	N.A.	N.A.
Espárrago en cosecha	Gusano de tierra	*Copitarsia decolora*	0.5	0.5	N.A.	N.A.
	Pococera	*Pococera atramentalis*	-	0.8	N.A.	N.A.
Granada	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.8	N.A.	N.A.
Holantao	Perforador de los frutos	*Argyrotaenia sphaleropa*	3.15 - 3.6	0.7 - 0.8	N.A.	N.A.
Mandarina	Gusano del brote del olivo	*Palpita persimilis*	3.12- 4.37	0.5 - 0.7	N.A.	N.A.
Olivo	Eupoecilia	*Eupoecilia ambiguella*	-	0.7 - 0.8	N.A.	N.A.
Palma aceitera	Gusano defoliador	*Sabulodes aegrotata*	-	1.0	N.A.	N.A.
Palto	Gusano del cesto	*Oiketicus kirby*	-	0.3 - 0.5	N.A.	N.A.
	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.
Pimiento						

PC: Periodo de carencia en días *LMR:* Límite máximo de residuos en ppm N.A.: No aplica

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

LAOJITA SC®

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN
Bacillus thuringiensis var. kurstaki 4000 UI/µl.....91.3 %
Fermentación líquida
Aditivos..... c.s.p.100 %

Registro PBUA N° 129 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO
Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937
info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:
SHANDONG LUKANG BIOLOGICAL PESTICIDES CO., LTD.
N° 1 Qilu Street, Qihe County, Shandong Province, China 251100 Telf. 0534-5332296 / 5337908

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR:
NOVAGRO-AG S.A.C.
Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú. Teléfono: +51 (044) 273330.
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

NovAgro-AG®
Ayudamos a producir frutas y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **500 mL**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

PRECAUCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Botella gemela - Izquierda 16/07/2024

LAOJITA SC®

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN
Bacillus thuringiensis var. kurstaki 4000 UI/µl.....91.3 %
Fermentación liquida
Aditivos... c.s.p.100 %

Registro PBUA N° 129 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO
Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937
info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:
SHANDONG LUKANG BIOLOGICAL PESTICIDES CO., LTD.
N° 1 Qilu Street, Qihe County, Shandong Province, China 251100 Telf. 0534-5332296 / 5337908

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR:
NOVAGRO-AG S.A.C.
Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú. Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

NovAgro-AG®
Ayudamos a producir frutas y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **500 mL**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Algodón	Gusano de la bellota	*Heliothis virescens*	1.05 - 1.2	0.7 - 0.8	N.A.	N.A.
Arándano	Cryptocephalus	*Cryptocephalus sp.*	3.0 - 3.84	1.0 - 1.2	N.A.	N.A.
	Gusano perforador de los frutos	*Heliothis virescens*	1.2 - 2.38	0.6 - 0.7	N.A.	N.A.
Camote	Caballada	*Spodoptera eridania*	1.75 - 2.0	0.7 - 0.8	N.A.	N.A.
Espárrago	Gusano de la bellota	*Heliothis virescens*	2.5 - 3.0	-	N.A.	N.A.
	Gusano ejército	*Spodoptera frugiperda*	-	0.5 - 0.8	N.A.	N.A.
Espárrago en cosecha	Gusano de tierra	*Copitarsia decolora*	0.5	0.5	N.A.	N.A.
Granada	Pococera	*Pococera atramentalis*	-	0.8	N.A.	N.A.
Holantao	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.8	N.A.	N.A.
Mandarina	Perforador de los frutos	*Argyrotaenia sphaleropa*	3.15 - 3.6	0.7 - 0.8	N.A.	N.A.
Olivo	Gusano del brote del olivo	*Palpita persimilis*	3.12- 4.37	0.5 - 0.7	N.A.	N.A.
Palma aceitera	Euprosterna	*Euprosterna elaeasa*	-	0.7 - 0.8	N.A.	N.A.
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	-	1.0	N.A.	N.A.
	Gusano del cesto	*Oiketicus kirby*	-	0.3 - 0.5	N.A.	N.A.
Pimiento	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia en días *LMR:* Límite máximo de residuos en ppm N.A.: No aplica

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

-No limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de las partes del equipo.

-Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.

-No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.

-Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.

-Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.

-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

LAOJITA SC debe guardarse en un lugar fresco y seco. En almacenamientos prolongados el producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 30°C.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-En caso de contaminación de los ojos con la solución concentrada, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

-En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

-En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, entre otros, llevar al paciente al médico mas cercano.

-Provoque el vómito en caso de ingestión y consiga ayuda médica.

-En caso de emergencia toxicológica llamar:

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
Titular GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO.: +51 (01) 2663828 ó SAMU: 106

PRECAUCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

SIZE: 14.5 x 21.0 cm 16/07/2024

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

LAOJITA SC

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO
INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN
Bacillus thuringiensis var. kurstaki 4000 UI/µl.....91.3 %
Fermentación liquida
Aditivos..... c.s.p.100 %

Registro PBUA N° 129 - SENASA

Nombre químico:
***Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*:**

(CAS): N/A

Número CAS:

***Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*:**

N° CAS: 68038-71-1

Peso Molecular
***Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*:** 35792.0 g/mol

Propiedades físico-químicas:
Apariencia: Líquido marrón-café con olor característico a fermentado bacteriano
pH: 6.0 – 7.0

TITULAR DEL REGISTRO:
GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO
Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú .
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937, info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:
SHANDONG LUKANG BIOLOGICAL PESTICIDES CO., LTD
N° 1 Qilu Street, Qihe County, Shandong Province,China 251100 Telf. 0534-5332296 / 5337908

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR:
NOVAGRO-AG S.A.C.
Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú
Teléfono: +51 (044) 273330. ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

NovAgro-AG®

Ayudamos a producir frutas y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

PRECAUCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

SIZE: 14.5 x 21.0 cm 16/07/2024

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-No limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de las partes del equipo.
-Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
-No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
-Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.
-Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
LAOJITA SC debe guardarse en un lugar fresco y seco. En almacenamientos prolongados el producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 30°C.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-En caso de contaminación de los ojos con la solución concentrada, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
-En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
-En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, entre otros, llevar al paciente al médico mas cercano.
-Provoque el vómito en caso de ingestión y consiga ayuda médica.
-En caso de emergencia toxicológica llamar:

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
Titular GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO.: +51 (01) 2663828 ó SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos o restos de aplicación.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LAOJITA SC es un insecticida biológico a base de una cepa de *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*, que controla insectos plaga, actúa por ingestión. Después de ser ingerido por la larva del insecto, causa inapetencia, deteniendo el daño del cultivo, las larvas mueren en un lapso de 2 a 4 días.

Sistemas de preparación y aplicación:
a. En 3 a 5 litros de agua diluir el coadyuvante en la dosis recomendada.
b. En la pre-mezcla (a) diluir la dosis recomendada de LAOJITA SC y agitar muy bien (usar escobillón de lavar)

Es recomendable preparar la mezcla justo antes de la aplicación y usarse todo el producto pre mezclado antes de las 4 horas siguientes

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Algodón	Gusano de la bellota	*Heliothis virescens*	1.05 - 1.2	0.7 - 0.8	N.A.	N.A.
Arándano	Cryptocephalus	*Cryptocephalus sp.*	3.0 - 3.84	1.0 - 1.2	N.A.	N.A.
	Gusano perforador de los frutos	*Heliothis virescens*	1.2 - 2.38	0.6 - 0.7	N.A.	N.A.
Camote	Caballada	*Spodoptera eridania*	1.75 - 2.0	0.7 - 0.8	N.A.	N.A.
Espárrago	Gusano de la bellota	*Heliothis virescens*	2.5 - 3.0	-	N.A.	N.A.
	Gusano ejército	*Spodoptera frugiperda*	-	0.5 - 0.8	N.A.	N.A.
Espárrago en cosecha	Gusano de tierra	*Copitarsia decolora*	0.5	0.5	N.A.	N.A.
Granada	Pococera	*Pococera atramentalis*	-	0.8	N.A.	N.A.
Holantao	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.8	N.A.	N.A.
Mandarina	Perforador de los frutos	*Argyrotaenia sphaleropa*	3.15 - 3.6	0.7 - 0.8	N.A.	N.A.
Olivo	Gusano del brote del olivo	*Palpita persimilis*	3.12- 4.37	0.5 - 0.7	N.A.	N.A.
Palma aceitera	Euprosterna	*Euprosterna elaeasa*	-	0.7 - 0.8	N.A.	N.A.
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	-	1.0	N.A.	N.A.
	Gusano del cesto	*Oiketicus kirby*	-	0.3 - 0.5	N.A.	N.A.
Pimiento	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia en días *LMR*: Límite máximo de residuos en ppm N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda un máximo de 03 aplicaciones por campaña, considerando un intervalo de aplicación de 12 a 20 días, en cualquier etapa del cultivo en infestación inicial de la plaga.
*En el cultivo de palto realizar 01 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

4 horas después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a la s indicaciones e instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD

LAOJITA SC no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o pH alcalino.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA