

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE,  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse para conservar alimentos.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las 12 horas siguientes a su aplicación.
- No tener contacto con la piel o los ojos para evitar irritaciones.
- Manipule los envases con cuidado para evitar rupturas o derrames.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.

-PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico:** Cyclo-octane
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y corriente, por lo menos quince minutos, cuidando que los párpados queden abiertos.
- Lavar el estómago con carbón medicinal y bicarbonato de sodio y luego sulfato de sodio con purgante (no de ricino).

# Halizan

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

MOLUSQUICIDA

CEBO EN TROZOS - (SB)

Composición:

Metaldehyde..... 50 g/Kg

Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del Registro: HORTUS S.A.  
Calle Sucre N° 270, Ate Lima, Perú

Formulado y envasado por:



Zhejiang Longyou East Anasac Crop  
Science Co., Ltd  
Town South Donghua District Longyou County,  
Zhejiang, China  
Tel: +86-10570-7855158

Contenido Neto : 250 g  
Lote :  
Fecha de formulación :  
Fecha de vencimiento :

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate, Lima, Perú  
Telf.: 717-9040 Fax: 718-9684  
RUC: 20101637221  
RU N° 141097

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE,  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- Hacer infusiones de sal y glucosa y en presencia de acidosis, infusiones de lactato sódico.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre, si es necesario dar respiración artificial.
- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito). ESSALUD: 0801-1-10200. CISPROQUIM: 080050-847.

ANTÍDOTO:

No posee antídoto específico, realizar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

HALIZAN esta formulado en pellets para facilitar su aplicación y distribución como cebo. El ingrediente inerte posee un efecto atractivo y el ingrediente activo tiene una toxicidad evidente sobre caracoles y babosas, actuando por contacto y por ingestión.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

HALIZAN se aplica a mano o máquina; alrededor de la base de las plantas o en motoncitos distribuidos sobre la superficie afectada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar sobre las zonas más visitadas por los caracoles y babosas como zonas húmedas, cerca de paredes y malezas.

Es normal que los ataques de moluscos en cultivos comiencen por los extremos, movilizándose estos desde lugares anexos al cultivo en donde se han reproducido. En estos casos se recomienda aplicar HALIZAN en bandas paralelas separadas por 5 a 8 cm rodeando al cultivo, o bien protegiendo al cultivo donde empezó.

Cuando se trata de un ataque detectado tardíamente y el cual se encuentra generalizando, las bandas del producto deben disponerse en el sentido de las hileras de cultivo.

En frutales HALIZAN debe distribuirse en bandas en el sentido de la hilera de plantación.

La banda de aplicación no debe ser mayor de 5 cm.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas para reingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD: Aunque es compatible con todos los plaguicidas de uso común, no debe mezclarse con otros productos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO                                                                                | P L A G A S  |                      | DOSIS                  | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                        | Nombre Común | Nombre Científico    |                        |              |              |
| Huertos y Almacigos:<br>Acelga, Brócoli, Espinaca,<br>Fresa, Lechuga y Rabanito        | Caracoles    | <i>Helix aspersa</i> | 3 - 5 g/m <sup>2</sup> | NC           | NC           |
|                                                                                        | Babosas      | <i>Arion sp.</i>     |                        |              |              |
| Papa y Vid                                                                             | Caracoles    | <i>Helix aspersa</i> | 30 - 40 kg/ha          | NC           | NC           |
|                                                                                        | Babosas      | <i>Arion sp.</i>     |                        |              |              |
| Jardines y Viveros:<br>Azucena, Cucarda,<br>Geranio, Gladiolo,<br>Pensamiento, Violeta | Caracoles    | <i>Helix aspersa</i> | 3 - 5 g/m <sup>2</sup> | NC           | NC           |
|                                                                                        | Babosas      | <i>Arion sp.</i>     | 3 - 5 g/m <sup>2</sup> | NC           | NC           |
| Mandarina                                                                              | Caracoles    | <i>Helix aspersa</i> | 4 - 5 g/m <sup>2</sup> | NC           | NC           |
|                                                                                        | Babosas      | <i>Arion sp.</i>     |                        |              |              |

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

NC: No conocido.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

