


21.5 cm



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Azoxystrobin490 g/kg
Tebuconazole.....360 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

PQUA N° 1578 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC
Av. El Polo N°401 Of 610. Lima
Teléfono: 713-9960



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC

FORMULADO POR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW
CHEMICAL Co., Ltd.
Binhai Economic Development Area
Weifang, Shandong 262737, China.

Contenido Neto: 5 Kg

Lote N°:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

36 cm

36 cm

21.5 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar (aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Estrobilurina + Triazole

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

Teléfono de emergencia
CICOTOX:080013040 (línea gratuita)
ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRUSTAR es un fungicida con actividad protectante y curativa, que se recomienda para los cultivos de espárrago y vid controlando *Stemphylium vesicarium* y *Erysiphe necator*, respectivamente.

TRUSTAR se prepara haciendo una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

La aplicación puede realizarse con diversos equipos de aplicación terrestres.

La absorción de TRUSTAR puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Enfermedad		Dosis (kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.16	40	* 0.01 ** 0.02
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.10	14	* 2.00 ** 0.50

* Azoxystrobin, ** Tebuconazole

P.C. = Periodo de carencia

LMR = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña, para ambos cultivos.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 12 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

