

28.10.22



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Hidróxido de Cobre..... 770 g/kg
Aditivos..... csp 1 kg

Reg. N° 507-97-AG-SENASA

Titular del Registro: SERFI S. A.

Formulado y Distribuido por:

Serfi
Av. República de Panamá 1077
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono: (51) 710-0068

Lote N° :
Fecha Emis.:
Fecha Venc.:

CONTENIDO NETO: 500 g

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sales de Cobre.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental provoque vómito, tomar leche y hacer un tratamiento sintomático. En caso de intoxicación severa, dar Calcium EDTA, Na2 EDTA ó Penicillamine.
- En caso de EMERGENCIAS llame a los siguientes teléfonos:
SAMU: 106
SERFI: 710-4068
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Puccin 77 WP es un fungicida cúprico a base de Hidróxido de cobre, formulado como polvo mojable. Puccin 77 WP contiene partículas de cobre muy pequeñas (1.8 micrones) lo que le confiere características únicas para este tipo de fungicidas protectantes como son: excelente cobertura y mayor adherencia al follaje, obteniéndose por lo tanto un mejor control de enfermedades.

Puccin 77 WP es ideal para la mezcla de triazoles para el control de royas y otras manchas foliares.

Preparación y Aplicación: Puccin 77 WP se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se comienza con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con mochila manual o automática.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedad	Agente causal	Dosis (g/kg)	PC (días)	L.M.R. (ppm)
Ajo	Mildiu	Peronospora allii	2.5	1.0-2.0	7
Ajo	Alternaria	Alternaria allii	2.5	1.0-2.0	7
	Botrytis	Botrytis allii	2.5	1.0-2.0	7
Cacao	Mildiu	Peronospora allii	3.5	2.1	7
	Roya	Helminthosporium	3.0-5.0	1.5-2.0	8
Café (*)	Roya	Helminthosporium	3.0-5.0	1.5-2.0	8
	Cercosporiosis	Dercospora coffeicola	4.0-5.0	1.5-2.0	8
Arañero	Mancha grisenta	Pollicularia	5.0	1.5-2.0	8
	Mancha amarilla	Pollicularia	5.0	1.5-2.0	8
Ojo de gallo	Mancha grisenta	Mycesma	4.0-5.0	1.5-2.0	8
	Mancha amarilla	Mycesma	4.0-5.0	1.5-2.0	8
Mandarina	Mancha grisenta	Mycosphaerella	1.25	2.0-2.25	2
Narigold	Mancha de la hoja	Alternaria sp.	2.5	1.0-2.0	ND
Paillo	Cladosporium	Cladosporium	2.5	1.8 - 2.0	7
Papa	Hielo o Ranciza	Phytophthora	2.5	1.5-3.0	7
Piña	Podredumbre	Phytophthora	2.5	2.0	1
Quinua	Mildiu	Peronospora	3.0	1.7-1.8	14
Vid	Mildiu	Plasmopara	2.5	2.0	7

PC.: Período de Carenza L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

NA: No Aplica (*) En el caso de Café para control de Roya se recomiendan 2 aplicaciones por campaña/año

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Como medida general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales, favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa). En el caso de cacao, se recomienda aplicar en la etapa fenológica de fructificación.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas

COMPATIBILIDAD

Puccin 77 WP es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a la señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos".

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contamine ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



MV PRODUCCIONES GRAFICAS



C100 M0 Y0 K0 C78 M2 Y98 K9
C0 M30 Y95 K0 K100