

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión). No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora, durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Anilino pirimidina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente el médico y muéstrele la etiqueta y Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (atención 24 horas)
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX: (01)328-7700; INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de no menos de 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ADAMA

Predict®
600 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Pyrimethanil 600 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA N° 1581-SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1 C N° 7-53 Int.
Zona Franca Barranquilla, Colombia

CONTENIDO NETO: 500 ml

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Predict 600 SC es un fungicida de acción por contacto, traslaminar y fase de vapor dirigido al control preventivo y curativo del hongo causante de la podredumbre gris (*Botrytis cinerea*). Agite bien el envase antes de abrir. Utilice gotas fina para asegurar una buena cobertura de las inflorescencias y frutos. Alternar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS (L/200 L) | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
| Arándano | Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>) | 0.20 | 0 | 8.0 |
| Mandarina | Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>) | 0.10 - 0.125 | 1 | 8.0 |
| Tomate | Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>) | 0.15 - 0.20 | 1 | 8.0 |
| Vid | Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>) | 0.18 | 7 | 0.5 |

P.C.: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Hasta dos (02) aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña por año y una frecuencia entre aplicaciones de 10 días para los cultivos de tomate y vid; y 15 días para los cultivos de arándano y mandarina, como mínimo.

Momento de aplicación:
Desde floración hasta fructificación del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver información en Hoja Informativa

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones 230 mm x 120 mm

Nota: Esta etiqueta va acompañada de hoja informativa adjunta