

22.6 cm

1 cm

0.5 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR
EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No almacenar en casa-habitación, alejado de fuentes de calor o chispas, en un lugar sombreado y ventilado.
- No permitir el ingreso al área tratada de personas embarazadas, niños y personas en general ni animales domésticos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico : Estrubilurina + Triazol
- En caso de intoxicación llame al médico, comunicarse con un centro de emergencias toxicológicas o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión: No provocar vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente, obtener asistencia médica inmediatamente, comunicarse con un centro de emergencias o trasladar al paciente a un centro médico.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia toxicologica llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) CROP BUSINESS SAC: 349-2669
CIPROSQUIM: 328-7398 Centro Nacional de Emergencia Essalud: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autirozado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.



AZOTRIN TOP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Azoxystrobin..... 200 g/L
Difenoconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg PQUA N° 1561- SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización
Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA
Teléfono: 349-2669

Formulado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
West Tower, Fortune International Building
N° 359 Hongwu Road, Nanjing
CHINA

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 500 ml
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

AZOTRIN TOP es un fungicida sistémico y traslaminar de amplio espectro utilizado para el control del “Tizón temprano”, “Mancha del peral” y “Pyricularia” en los cultivos de papa, cebolla y arroz respectivamente.

AZOTRIN TOP se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis en la mitad del volumen de agua, agitar bien y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Papa	“Tizón temprano”	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.4	7	0.1
Cebolla	“Mancha del peral”	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1	0.3	3	0.01
Arroz	“Pyricularia”	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.5	30	5.0* 0.05**

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuo *Azoxystrobin **Difenoconazole

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Para los cultivos de papa y cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

Para el cultivo de arroz realizar hasta 1 aplicación por campaña.

Aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: AZOTRIN TOP es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: AZOTRIN TOP no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



NOMBRE COMERCIAL

NEGRO

C:0 M:0 Y:0 K:100

12 cm

1.8 cm