

PILARMECTIN 1.8 EC 500ml 22.8 x12 cm. COEX 30.05.16

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa una severa irritación a los ojos.
- Este producto es sensibilizante a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No aplicar en dirección contraria al viento.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Avermectina.
 Si se produce el envenenamiento, inmediatamente contacte a un médico, a un centro de información toxicológica. Mostrar la etiqueta.
 En caso de inhalación: trasladar a la persona al exterior y mantenerla en reposo hasta que se recupere. Si no está respirando, dar respiración artificial. Obtenga atención médica.
 En caso de contacto cutáneo: remover la ropa contaminada, lavar con agua y jabón durante 15 minutos aproximadamente la zona afectada. Obtenga atención médica si se desarrolla irritación.
 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua durante 15 minutos (quitar los lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después consultar a un médico.
 En caso de ingestión, administrar suspensión de carbón activado. Si la cantidad ingerida fue importante puede encontrarse indicado la inducción al vómito o la realización de un lavado gástrico siempre que el tiempo transcurrido haga útiles éstas maniobras. Acudir inmediatamente al médico para su tratamiento.

Antídoto: No se conoce antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 13- 040 (gratuito)
ESSALUD: 117 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Altamente peligroso para abejas.
 No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
 Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
 No aplicar en época de floración.
 Tóxico para organismos acuáticos.
 No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
 Respetar una banda de no aplicación de 10 m, hacia fuentes de agua.
 Peligroso para animales domésticos, fauna benéfica y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PILARMECTIN 1.8 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:
 Abamectin 18 g/L
 Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA Nº - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor :
FARMAGRO S.A.
 Av. Alfredo Mendiolá 6068, Los Olivos, Lima - PERÚ
 Teléfono: 6141500 Fax: 6141517



Formulador:
PILARQUIM (Shanghai) Co., Ltd.
 1500 Hang-tang Road Jin-Hui Town, Feng-xian District Shanghai,
 P.R. of China

CONTENIDO NETO: 500 ml

Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PILARMECTIN 1.8 EC, es aplicado en aspersión foliar y se utiliza a los primeros síntomas de la infestación, procurando tener una buena cobertura sin llegar a escurrimiento.
 PILARMECTIN 1.8 EC se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
 PILARMECTIN 1.8 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/cil	L/ha		
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	-	1.5	3	0.01
Vid	Ácaro de la yema	<i>Colomerus vitis</i>	0.2-0.3	-	28	0.01

L.M.R.= Límite máximo de residuos. P.C.= Período de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio de la detección de la plaga y repetir cuando sea necesario. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento total de la planta, sin llegar al escurrimiento.

Se recomienda un máximo 2 aplicaciones por campaña o año.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No se ha determinado incompatibilidad con otros plaguicidas, a excepción de captan; sin embargo en caso de requerirse mezcla con otros productos se recomienda hacer una prueba a pequeña escala antes de la aplicación, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

