

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nongji[®] 20 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Flubendiamide 200 g/Kg
Aditivos c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA N° 1277 - SENASA

Titular del registro:

AVGUST PERU SAC

Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt Santiago de Surco, Lima - Perú

Formulado por:

Nyngbo Synagrochem Co., Ltd.

N°757, Rili Middle Road, Ningbo 315199, China.

Importador y Distribuidor:

avgust 
crop protection

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 100g

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con los ojos.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Use lentes integrales de protección.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzenodicarbonamidas o diamida de ácido ftálico.
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No induzca el vómito, no suministre nada por la boca, cuando la persona esté inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los párpados abiertos, enjuagar lenta y generosamente con agua, en forma continua por 15-20 minutos. Buscar atención médica de inmediato.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y los zapatos de inmediato. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Buscar atención médica de inmediato y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación llevar al paciente al aire fresco. Si la persona no está respirando, suministre respiración artificial. Consulte al médico o a un centro toxicológico de inmediato y muéstrela la etiqueta.
- Nota al médico. No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
AVGUST PERU SAC: 016522182

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola.
- Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.

- No contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivo de al menos 5 metros.
- Es peligrosos para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NONGI 20 WG es un insecticida con un modo de acción que afecta la función propia de los músculos de los insectos actuando sobre los receptores de la ryanodina.

El principal modo de acción es por vía oral o por contacto con la dermis del insecto. **NONGI 20 WG** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o motor.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado 1 vez por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estadios larvales de desarrollo.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

NONGI 20 WG, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	Maleza		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/Ha	Kg/200L		
Esparrago	Gusano de foliador	<i>Copitarsia decolora</i>	0.2-0.25	-	7	0.01
	Caballada (gusano ejército)	<i>Spodoptera eridania</i>	0.2-0.25	-	7	0.01
Paprika	Polilla (gusano de fruto)	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.15-0.2	-	1	0.2
Algodón	Gusano menor de la hoja del algodonnero	<i>Anomis texana</i>	0.1-0.15	50-75	28	0.01
Tomate	Barrenador de frutos y guías	<i>Diaphania nitidalis</i>	-	50-75	1	0.6
Pailto	Gusano medidor	<i>Sabulodes aegrotata</i>	-	50-75	30	0.01
Brócoli	Polilla del dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.15 - 0.175	75-87.5	1	0.01

P.C: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuo

