"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Causa irritación moderada en los ojos. Evitar el contacto con la piel, ojos
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después de usar este producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Dicarboximida
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, buscar ayuda médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre y buscar atención médica.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.
En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas),
ESSALUD EN LÍNEA: 411 8000 Opción 4, FITOCORP SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

BOTRI- ONE 50 WP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE -WP

COMPOSICIÓN

Iprodione..... 500 g/Kg
Aditivos.....c.s.p 1 Kg

Registro PQUA N° 1245 - SENASA

Titular del registro:
FITOCORP SAC
Jr. Las Poncianas N° 147 Interior 2 B. Urb. La Molina Vieja. La Molina - Lima
Teléfono: 016522182

Formulado por:
KINYIELD INDUSTRY CO.,LIMITED
Unit 905 Workingberg Commercial Building 41 - 47 Marble Road, Hong Kong

Importador y distribuidor:

Contenido Neto: 100 g

Lote Nro:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Es un fungicida de contacto y preventivo que actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.

Se diluye la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Ajo	"Pobredumbre blanca"	*Sclerotium cepivorum*	0.4	-	21	0.2
Alcachofa	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	-	0.5	14	0.05
Cebolla	"Moho gris"	*Botrytis sp.*	-	0.8	14	0.2
Mandarina	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	0.20	0.50	30	1
Manzano	"Pudrición de las flores"	*Botrytis cinerea*	0.25	-	14	5
Naranjo	"Podredumbre gris/moho gris"	*Botrytis cinerea*	-	1.5	14	0.02
Palto	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	-	1.00	30	0.02
Tomate	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	0.20	-	7	0.5
Vid	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	-	1.00	5	0.45

PC: Periodo de carencia(días) LMR: Límite Máximo de Residuos(ppm:partes por millón)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Se recomienda la aplicación de **BOTRI-ONE 50 WP** cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. La aplicación debe realizarse previo monitoreo del cultivo.se puede realizar como máximo 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de las 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

BOTRI-ONE 50 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO