"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación en los ojos. Evitar el contacto con la piel, ojos
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS.
- Grupo químico: Dicarboximida
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, buscar ayuda médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre y buscar atención médica
- En caso de contacto con la piel,quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático

En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX Telf. : 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4
AVGUST PERU SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposíotelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para los organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivo de al menos 5 metros.
- Es peligrosos para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada,
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Botri-one® 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:
Iprodione..... .....500 g/kg
Aditivos .....c.s.p 1kg

Reg. PQUA N° 1245 - SENASA

Titular de Registro
AVGUST PERU SAC
Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.
Formulado por:
Kinyield Industry Co. Limited.
Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47, Marble Road, Hong Kong - China.

Importador y Distribuidor:

avgust crop protection

Contenido Neto: 25 Kg
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Es un fungicida de contacto y preventivo, que actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta

Se diluye la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Ajo	Podredumbre blanca	*Sclerotium cepivorum*	0.4	-	21	0.2
Alcachofa	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	0.5	14	0.05
Cebolla	Moho gris	*Botrytis cinerea*	-	0.8	14	0.20
Mandarina	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.20	-	30	1.00
Manzano	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.25	-	14	5.00
Naranjo	Podredumbre gris/ moho gris	*Botrytis cinerea*	-	1.5	14	0.02
Palto	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	1.00	30	0.02
Tomate	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.20	-	7	0.5
Vid	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	1.00	5	0.45

PC: Periodo de carencia L M R : Límite Máximo de Residuos (ppm:partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda la aplicación de **BOTRI-ONE 50 WP** cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. La aplicación debe realizarse previo monitoreo del cultivo, se puede realizar como máximo 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar al área tratado antes de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
BOTRI-ONE 50 WP, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada..

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO