

QUIMIZEB® 80 WP

QUIMIZEB® 80 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - PM

Composición:

Mancozeb 800 g/Kg
Aditivos c.s.p 1 Kg

Reg. N° 427-97-AG - SENASA

Titular del Registro:



Contenido Neto: 400 g

Formulado por:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú
Telef.: 710-4000

Distribuido por:

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú
Telef.: 710-4000

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Guardar el producto bajo llave en un lugar fresco, seco, y con buena ventilación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Ditiocarbamato

- En caso de intoxicación:** llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos:** lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión:** Si el paciente ha ingerido gran cantidad del fungicida, y no ha ocurrido vómito, considerar el lavado gástrico. Puede usarse carbón activado o en mezcla con solución catártica (sorbitol).

Nota al médico: QUIMIZEB® 80 WP no tiene antidoto específico. Todo tratamiento deberá ser sintomático.

Teléfonos de emergencia:
CETOX: 0950-71911
ESSALUD: 411-8900 (opción 4)

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación en el tanque, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar un banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para éste fin.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

QUIMIZEB® 80 WP es un fungicida preventivo de contacto (no sistémico), que actúa inhibiendo la germinación de las esporas y el crecimiento del tubo germinativo, evitando la infección de las plantas.

QUIMIZEB® 80 WP posee partículas micronizadas otorgándole una mejor distribución, mayor adherencia y mejor persistencia en el follaje.

QUIMIZEB® 80 WP se usa en pulverizaciones sobre el follaje. Para preparar la solución de aplicación se deberá realizar previamente una pre-mezcla colocando agua en un envase, luego se agrega la cantidad de producto que se va a usar y agitar. Luego vaciar la pre-mezcla en el equipo de aplicación y agregar el total de agua que se va a aplicar. Es necesario calibrar el equipo de aplicación, así como el volumen de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO Y DOSIS:

CULTIVO	PLASAS		DOSIS		PC (g/L)	L/MH (litro/m²)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/100 200 L	kg/ha		
Papa	Helo o Rancho	Phytophthora infestans	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	7	0.2
Tomate	Helo	Phytophthora infestans	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	7	2.0
Marigold	Mancha de hoja	Alternaria spp.	0.5	1.0 - 2.0	7	0.1
Melón	Melón	Peronospora destructra	0.5	1.0 - 2.0	7	0.5
Pepino	Alternancia	Alternaria spp.	0.5	1.0 - 2.0	7	0.5
Papa	Cenicientos	Cenicientos spp.	0.5	1.0 - 2.0	7	0.5
	Roya	Puccinia spargangii	0.5 - 0.75	1.0 - 1.5	N.A.	0.1
Esparago	Cenicientos	Cenicientos spp.	0.5 - 0.75	1.0 - 1.5	N.A.	0.1
Peñonito	Helo o Rancho	Phytophthora infestans	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	7	1.0

PC: Puntos de Contacto L/MH: Litros por Metro Cuadrado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben de contemplar los niveles de daño económico de la enfermedad, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación.

PERIODO DE RENGRESO

No ingresar a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. Realizar una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, el se usa y maneje de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

