



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente.

Lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta
etiqueta y la hoja informativa adjunta.



TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
TOXICOLÓGICAS

INFOSALUD: 113
CICOTOX: (01) 328 - 7700
ESSALUD: (01) 411 - 8000, opción 4
INTEROC S.A. (511) 614-6100

Urkan®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

DIFLUBENZURON.....

METHOMYL.....

Aditivos.....

70 g/L

230 g/L

c.s.p.1 L

INTEROC

Pasado por la innovación

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442

Paño 10, Magdalena del Mar

Lima - Perú

Tel.: (511) 614-5100

Contenido Neto: 250 ml

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Reg. PQUA N° 555 - SENASA



Formulador:
NINGBO SUNJOY
AGROSCIENCE CO., LTD.

1165 Beihai Road, Chemical
Industry Zone of Ningbo,
Zhejiang Province - China

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	L/cil de 200L	L/ha		
Maíz Zea mays	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	21	0.05 (a) 0.02 (b)
Tomate Lycopersicon esculentum	Caballada gusano ejército	Spodoptera eridania	0.4 - 0.5	-	15	0.05 (a) 1 (b)
Frijol Phaseolus vulgaris	Gusano medidor de la hoja	Chrysodeixis (=Pseudoplusia) incluidens	0.4 - 0.5	-	21	0.05 (a) 1 (b)
Pimiento Capsicum annuum	Caballada gusano ejército	Spodoptera eridania	0.4 - 0.5	-	15	1 (a) 0.7 (b)

PC: Periodo de Carencia

(a) Diflubenzuron

(b) Methomyl

LMR: Limite Máximo de Residuos

