

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Basagran®600

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Susceptible de dañar al feto.
- El producto es DAÑINO no ingestir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese. Lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservé el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Benzothiazinone

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vomito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con agua fría.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y brindale una posición confortable para respirar.
- Antidoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847

BASF Peruana S.A.: 513 2505

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposito el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEJIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Muy tóxico para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Tóxico plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Basagran®600 es un herbicida selectivo para el control de ciperáceas y otras malezas de hoja ancha. Las gramíneas no son controladas por Basagran®600. Su acción es de contacto, interferiendo con la fotosíntesis en las áreas de hojas tratadas. **Grupo HRAC 6.**
- Puede aplicarse con equipo manual o mecánico con presión constante. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Para la aplicación utilice boquillas de abanico. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo.
- Llene el tanque con agua (limpia) hasta la mitad y agregar la cantidad necesaria diluyendo y completar a volumen total con agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZA		
	Nombre común	Nombre Científico	DOSIS L/Ha
Arroz	Coquito	Cyperus difformis	1.6 - 1.8
	Coquito	Cyperus rotundus	1.8
	Oreja de ratón	Commelinia diffusa	60
	Verdolaga	Portulaca oleracea	0.01

* PC = Período de Carencia

**LMR = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Basagran®600 debe ser aplicado una vez por campaña como máximo. Aplicar en post-emergency temprana.
- Se recomienda un gasto de agua no menor de 200 Litros/ha, para lograr una buena cobertura del área objeto de control de malezas.
- En el momento de aplicar Basagran®600, se recomienda bajar el nivel de agua de riego en la parcela para lograr un mayor contacto del herbicida con la maleza.
- De requerirse una segunda aplicación, usar otro herbicida de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO:

- Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 4 horas después de la aplicación, que es cuando se estima el depósito completamente secado.
- COMPATIBILIDAD:**
Se recomienda compatibilizar con la mayoría de los fertilizantes, fungicidas e insecticidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.
- FITOTOXICIDAD:**
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.
- RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

© = Marca Registrada BASF

DUWEST DROKASA



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO