

7.7 cm

0.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040    ESSALUD: 117

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

# NUPRID 350 SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Imidacloprid ..... 350 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 L

PQUA N° 1596 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

NUFARM PERÚ S.A.C

Av. Víctor A. Belaunde N° 147  
Via Principal 110 Edif. Real  
Cinco Of. 901 Lima 27 - Perú.

IMPORTADO Y

DISTRIBUIDO POR:

CYTOPERU S.A.C.

RUC: 20520757423  
Av. Isaac Newton N° 138,  
Urb. Industrial San Francisco,  
Ate - Lima - Perú .



Formulado por:

REOPEN S.A.

A Schweitzer 2834, (B1714 APH)  
Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires  
Argentina

Contenido neto: 250ml

F. de Form.:

N° de Lote:

F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NUPRID350SC es un insecticida sistémico y translaminar que actúa porcontacto e ingestión.  
NUPRID 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de plagas indicados en el cuadro de usos. "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

| CULTIVO   | PLAGA                                 |                                          | DOSIS<br>(ml/200L) | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                          | Nombre Científico                        |                    |                |                 |
| Espárrago | Caracha (mosquilla de los brotes)     | <i>Prodiplosis longifolia</i>            | 300                | 7              | 0.05            |
| Tomate    | Caracha (mosquilla de los brotes)     | <i>Prodiplosis longifolia</i>            | 250 - 300          | 7              | 0.5             |
| Vid       | Cochinilla harinosa                   | <i>Planococcus citri</i>                 | 150                | 14             | 1               |
| Páprika   | Caracha (mosquilla de los brotes)     | <i>Prodiplosis longifolia</i>            | 200                | 7              | 1               |
| Arroz     | Cigarrita del virus de la hoja blanca | <i>Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus</i> | 100 - 150          | 21             | 0.05            |

L.M.R. Límite máximo de residuos

P.C. Periodo de carencia

FRECUENCIAIYÉPOCADEAPLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento con **NUPRID 350SC** cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación del producto.

FITOTOXICIDAD:

**NUPRID 350 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



1.20 cm