25.30 cm

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de emergencia:
SAMU: 106 SMTM PERU S.A.C.: 01 421-4811

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

NUPRID 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Imidacloprid ..... 350 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

PQUA N° 1596 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
SMTM PERU S.A.C.
Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas
N° 208, Interior 705-B, TORRE III
Urbanización Club Golf Los Incas
Santiago de Surco, Lima, Perú

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
CYTOPERU S.A.C.
RUC: 20520757422
Av. Isaac Newton N° 138,
Urb.Industrial San Francisco,
Ate - Lima - Perú .

Contenido neto: 500 ml
F. de Form.:
N° de Lote:
F. de Venc.:

Formulado por:
PILARQUIM CO., LTD.
1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town,
Feng Xian District, Shanghai
China.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
NUPRID 350 SC es un insecticida sistémico y translaminar que actúa por contacto e ingestión.
NUPRID 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de plagas indicadas en el cuadro de usos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (ml/200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Caracha (mosquilla de los brotes)	*Prodiplosis longifila*	300	7	0.05
Tomate	Caracha (mosquilla de los brotes)	*Prodiplosis longifila*	250 - 300	7	0.5
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus citri*	100	14	1
Páprika	Caracha (mosquilla de los brotes)	*Prodiplosis longifila*	200	7	1
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	*Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus*	100 - 150	21	0.05

L.M.R. Límite máximo de residuos P.C. Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento con **NUPRID 350 SC** cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD: **NUPRID 350 SC** es compatible con un gran rango de pesticidas. No presenta incompatibilidades con otros productos fitosanitarios o fertilizantes.

FITOTOXICIDAD: **NUPRID 350 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.