

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCAJE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico, no ingerir.
- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Moderadamente irritante a los ojos, usar equipo de protección de la piel y cuerpo.
- Usar ropa íntima e higiénica, usar gafas protectoras.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Contener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, lavarse, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraje.
- No reversionar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar envases vacíos para almacenar alimentos, ni bebidas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neotoloxileno.
- En caso de intoxicación tener al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Si no respira artificialmente si fuera necesario.

Teléfonos de emergencia:
SAMU: 106 SAMU PERU S.A.C.: 01 421 4811

ANTIDOTO: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicela, triturándola o perforándola y depositarla en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del recipiente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- No disponer con residuos municipales.
- No verter los residuos en fuentes de agua.
- No realizar los envases vacíos.
- No utilizar los envases vacíos inmediatamente después de concluir la labor de campo.

MEASURAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y avispas.
- Peligroso para las aves acuáticas.
- Peligroso para los peces acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, esteros o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o residuos del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el silo destinado por las autoridades para tal fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia campos de agua de al menos 5 metros.



NUPRID 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Imidacloprid 350 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

PQUA N° 1596 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

SMTM PERU S.A.C.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas
N° 208, Intercambio 705-B, TORRE III
Urbanización Club Golf Los Incas
Santiago de Surco, Lima, Perú

IMPORTADO Y

DISTRIBUIDOR POR:

CYTOPERU S.A.C.
RUC: 20520757423
Av. Isaac Newton N° 138,
Urbanización San Francisco,
Ate - Lima - Perú.

Formulado por:

PILARQUIM CO., LTD.
1500 Heng-Teng Road, Jin-Hui Town, Feng
Xian District, Shanghai - China.

Contenido neto: 5 L

F. de Form.:

N° de Lotis:

F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
NUPRID 350 SC es un insecticida sistémico y translocante que actúa por contacto e ingestión.
NUPRID 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de plagas indicadas en el cuadro de usos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (ml/100L)	P.C. (días)	L.A.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Caracha (mosquilla de las raíces)	<i>Prodiplasis longilla</i>	300	7	0.05
Tomate	Caracha (mosquilla de las raíces)	<i>Prodiplasis longilla</i>	250 - 300	7	0.5
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	150	14	1
Paprika	Caracha (mosquilla de las raíces)	<i>Prodiplasis longilla</i>	200	7	1
Aroz	Cigarrita del vicio de la hoja blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	100 - 50	21	0.05

L.A.R.: Límite máximo de residuos

P.C.: Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento con NUPRID 350 SC cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campo/cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación del producto. Cuando la nube de la aplicación se haya dissipado y las gotas sobre el follaje se hayan secado.

COMPATIBILIDAD: NUPRID 350 SC es compatible con un gran rango de pesticidas. No presenta incompatibilidades con otros productos fitosanitarios o fertilizantes.

FITOTOXICIDAD: NUPRID 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: NUPRID 350 SC no tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Es empleado mediante aplicaciones foliares, mediante aspersión dirigida al follaje.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Las aspersiones pueden hacerse con mochilas manuales, a motor o con fumigadoras acopladas al tractor. Se deben emplear equipos debidamente calibrados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para las fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

