

32.00 cm

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Moderadamente irritante a las vías respiratorias y tracto respiratorio.
- Moderadamente irritante a la piel, usar equipo de protección de la piel y cuerpo.
- Ligeramente irritante a los ojos, usar gafas protectoras.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reusar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar envases vacíos para almacenar alimentos, ni bebidas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinóide.
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico inmediatamente o lleve a la solución en la mezcla de levitación.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y transfírela a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040

ESSALUD: 117

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de la aplicación, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de levitación y luego muéltelo.
- Realice la aplicación en el triple lavado del presente envase.
- De vuelta el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- No disponer con residuos en fuentes de agua.
- No verter los residuos en fuentes de agua.
- No reutilizar los envases vacíos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

NUPRID 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Iniciadoprind 350 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

PQUA N° 4596 - SEMASA

TITULAR DE REGISTRO:

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC

NUPRID 350 SC



Formulado por:

PILARQUIM CO., LTD.

1500 Hang-Tung Road, Jih-Hui Town, Feng

Xian District, Shanghai - China.

Formulado por:

CYTOPERU S.A.C.

RUC: 20520757423

Nº de Identificación: 110 Edif. Real

Alameda San Francisco,

Ala - Lima - Perú.

Contenido neto: 20 L

F. de Form.:

Nº de Lote:

F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NUPRID 350 SC es un insecticida sistémico y translinar que actúa por contacto o ingestión. NUPRID 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de plagas indicadas en el cuadro de usos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CUADRO DE USOS

CULTIVO	Nombre Común	PLAGA	DOSIS (ml/200L)	P.C. (dias)	L.M.R. (ppm)
Espárrago	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	300	7	0.05
Tomate	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	250 - 300	7	0.5
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Pterocommus citri</i>	150	14	1
Páprika	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	200	7	1
Arroz	Cigarrita del virre de la hoja blanca	<i>Taposodes (=Sogatodes) orizicolus</i>	100 - 150	21	0.05

L.M.R. Límite máximo de residuos

P.C. Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento con NUPRID 350 SC cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación del producto. Cuando la nube de la aplicación se haya disipado y las gotas sobre el follaje se hayan secado.

COMPATIBILIDAD: NUPRID 350 SC es compatible con un gran rango de pesticidas. No presenta incompatibilidades con otros productos fitosanitarios o fertilizantes.

FITOTOXICIDAD: NUPRID 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: NUPRID 350 SC no tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCEIVOS: No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos. MÉTODO DE APLICACIÓN: Es empleado mediante aplicaciones foliares, mediante aspersión dirigida al follaje.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Las aspersiones pueden hacerse con mochilas manuales, a motor o con fumigadoras acopladas al tractor. Se deben emplear equipos debidamente calibrados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en esta envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

15.00 cm