

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

V Nuron® 500 SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Linuron 500 g/L

Aditivos c.s.p 1L

Req. PQUA N° 1259 - SENASA

Titular del Registro:

AVGUST PERU SAC

Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt
Santiago de Surco, Lima - Perú.

Formulado por:

Nyngbo Synagrochem Co., Ltd.
N°757, Rili Middle Road, Ningbo 315199, China.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:
Contenido neto: 5L
Fecha de vencimiento:

Importador y Distribuidor:

avgust crop protection

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

V_NURON 500 SC es un herbicida selectivo, sistémico utilizado para el control de malezas (malezas de hoja ancha, gramíneas y algunas malezas perennes), en los cultivos de cebolla, papa y espárragos. Se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	PLAGA		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	0.5	N.R.	0.05
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Charinco	<i>Datura stramonium</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Campanilla morada	<i>Ipomoea purpurea</i>			
Papa	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	0.5-0.75	N.R.	0.05
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>			
Espárrago	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1-1.5	1	7
	Garrapallita	<i>Sida spinosa</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>			
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium ambrosioides</i>			
Cebolla	Pata de gallin	<i>Eleusine indica</i>	1-1.5	1	7

PC: Periodo de carencia
N.R: No Relevante.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Por lo general, la etapa apropiada para la aplicación de **V_NURON 500 SC** es post-trasplante en el cultivo de cebolla, y post-siembra, antes de la rotación en el cultivo de papa. Se recomienda realizar una sola aplicación por campaña. En el espárrago aplicar después del chapado antes de la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina y oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se aplica en el momento y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

