

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Spiroketalamine.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito, no le de nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuagar suavemente y lentamente con agua por 15 a 20 minutos. Sacar los lentes de contacto luego de 5 minutos y continuar enjuagando los ojos.
- En caso de contacto con la piel: Sacar la ropa contaminada, enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua por 15-20 minutos.
- En caso de inhalación: Retirar al paciente del lugar de exposición, monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es netamente sintomático.
- **Teléfonos de emergencia:**
CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Sancrop®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Spiroxamine.....500 g/L
Aditivos.....c.s.p..... 1.0 L

Reg. PQUA N° 1017 - SENASA

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD
Room 10-6, Shidai Square, N° 8,
Lengjing Street, Street, Ningbo 315010,
Zhejiang, P. R. China.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 20 L

Lote N° :

F. Form. :

F. Venc. :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMEX S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SANCROP® es un fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicativa que penetra rápidamente dentro del tejido de la hoja, seguido de una translocación acropétala hasta la punta de la hoja.

SANCROP® es un fungicida Inhibidor de la Biosíntesis del Esterol (SBI), actúa inhibiendo la biosíntesis de los esteroides fúngicos.

SANCROP® se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	%	L/ha		
ALCACHOFA	Oidiois	Leveillula taurica	-	0.5 -0.6	N.D	0.7
PIMIENTO, PÁPRIKA, PIQUILLO	Oidiois	Leveillula taurica	-	0.5 -0.6	N.D	0.05
VID	Oidiois	Erysiphe necator	0.06	-	14	1

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

P.C.: Período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar dos aplicaciones por campaña como máximo, siendo una campaña por año para vid, pimiento y alcachofa, y con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 15 días. Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de las enfermedades que controla, o cuando la planta empiece a presentar los primeros síntomas.

PERÍODO DE REINGRESO

No permitir reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación a niños, personal en general y animales.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con agentes fuertemente oxidantes y ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD.

SANCROP® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

