

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

PRIMEROS AUXILIOS

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN

- Reg. PQUA N° xxxx - SENASA**

FORMULADO POR:
Point Agro-China Limited.
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
AGROKLINGE S.A.
Cal. Rene Descartes Nro. 311.
Urb. Santa Raquel - II Etapa, Ate.
Telf. 612-6565



CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

GOLAZO 72 SL, es un herbicida hormonal selectivo post emergente, para el control de la mayoría de malezas de hoja ancha. Al ser aplicado sobre las malezas se transloca hacia las partes apicales (de crecimiento continuo) activando de manera descontrolada el desarrollo de la planta con su consiguiente muerte. Los síntomas por lo general son hipertrofia y deformación de la planta.

Llenar el tanque con agua hasta la mitad, luego diluya la dosis indicada y complete con agua hasta alcanzar el volumen total. Agite y proceda a aplicar. La aplicación se puede hacer con cualquier equipo de aspersión, manual o mecánico y con boquilla adecuada para herbicidas de buena cobertura, tratando de hacer una aplicación uniforme. Hacer las aplicaciones por las mañanas (poco viento) para evitar la contaminación de cultivos vecinos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

Cultivo	Malezas		Dosis L/200 L	PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Chamico	<i>Datura stramonium</i>	0.75-1	7	0.05
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physaloides</i>	0.75-1	7	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	0.75-1	7	0.05
Caña de azúcar	Chamico	<i>Datura stramonium</i>	2	42	0.05
	Hierba del Gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>	2	42	0.05
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>	2	42	0.05
	Lechera	<i>Euphorbia hirta</i>	2	42	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2	42	0.05
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physaloides</i>	2	42	0.05
	Alfalfilla	<i>Melilotus indicus</i>	2	42	0.05
Trigo	Cardo santo	<i>Argemone mexicana</i>	0.75 -1	14	0.5
	Mostaza	<i>Brassica campestris</i>	0.75 -1	14	0.5

PC: Periodo de carencia en días LMR: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar GOLAZO 72 SL, una (1) aplicación por campaña como máximo, considerando 2 campañas al año para el cultivo de maíz y 1 campaña por año para el cultivo de caña de azúcar y trigo.

Se recomienda aplicar después de la siembra en las primeras etapas de las malezas

PERÍODO DE REINGRESO:No reingresar hasta después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Por su especificidad sobre el control de malezas de hoja ancha se recomienda aplicar solo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas en la etiqueta. Es fitotóxico al algodón, tomate, beterraga y árboles frutales.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Gota