

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la nebulización.
- No comer, beber, fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Alimentar al producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazol
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administrar nada oralmente a una persona inconsciente. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y lavado con abundante agua.
- En caso de contacto con la piel, lavar bien las zonas con agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- En caso de inhalación, transportar la persona al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Si la aplicación es difícil, efectuar respiración artificial.
- Se recomienda lavar el envase o la etiqueta del producto.
- Se recomienda tener el envase o la etiqueta del producto.
- Antídoto: no tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático de soporte.
- Teléfono de emergencia:

SAMU: 106

SMTM PERU S.A.C.: 01 421-4811

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego infiltrelo, intente con el agua corriente y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No permitir que los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



NUZOLE SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Composición:
Tebuconazole..... 430 g/L
Aditivos..... CSP 1L

Reg. POLUA N° 1604 - SENASA

Titular del Registro: SMTM PERU S.A.C.
Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas
N° 206, Interior 705-B, TORRE III,
Urbanización Club Golf Los Incas
Santiago de Surco, Lima, Perú

Formulador:
REOPEN S.A.
Rio Drey s/n Barrio CineCine (1748)
Gral. Rodríguez
Buenos Aires - Argentina

Importado y Distribuido por:
CYTOPERU S.A.C.
RUC: 20520757423
Av. Isaac Newton N° 138, Urb. Industrial San
Francisco, Ate - Lima - Perú

Fecha de Form.:

Lote N°:

Contenido Neto: 10 L

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NUZOLE SC es un fungicida sistémico, será usado en el control *oidiosis* *Erysiphe necator* en el cultivo de vid.

La aplicación de NUZOLE SC se debe realizar en forma dirigida a la planta, realizando una distribución uniforme del Fungicida (caldo y/o solución) a lo largo de los surcos, se recomienda hacer aplicaciones preventivas cuando la enfermedad está en etapas iniciales, es importante mantener una buena humedad del terreno para el buen desempeño del Fungicida se recomienda realizar las aplicaciones a tempranas horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (litros)	P.C. (litros)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.40	14	6

P.C.: Período de Carenia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar una única aplicación durante el desarrollo de las hojas.

PERÍODO DE REINGRESO:
12 horas

COMPATIBILIDAD:
NUZOLE SC es incompatible con soluciones alcalinas fuertes, genera reacciones de descomposición.

FIOTOXICIDAD:
NUZOLE SC, usado a las dosis indicadas en el cuadro de instrucciones de uso, no presenta problemas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta, y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

