

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazol
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos como mínimo.
- En caso de contacto con los ojos, lava bien los ojos con agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- En caso de inhalación, transportar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si la respiración es dificultosa, ofrecer respiración artificial. Consiga atención médica si persiste la dificultad respiratoria.
- Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto
- Antídoto: no tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático de soporte.
- Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0-800-1-3040
ESSALUD: 117
NUFARM PERÚ SAC: 440-6011

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

NUZOLE SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Composición:

Tebuconazole.....430 g/L
Aditivos.....csp 1L

Reg. PQUA N° 1604 - SENASA
Titular del Registro: NUFARM PERU S.A.C.

Formulador:
REOPEN S.A.
Rio Dery s/n Barrio CinaCina (1748)
Gral. Rodriguez
Buenos Aires – Argentina

Importado y Distribuido por:
CYTOPERU S.A.C.
RUC: 20520757423
Av. Isaac Newton N° 138, Urb. Industrial San Francisco, Ate – Lima – Perú

Fecha de Form.:
Lote N°:

Contenido Neto: 20 L

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NUZOLE SC es un fungicida sistémico, será usado en el control *oidiosis Erysiphe necator* en el cultivo de vid.

La aplicación de NUZOLE SC se debe realizar en forma dirigida a la planta, realizando una distribución uniforme del Fungicida (caldo y/o solución) a lo largo de los surcos, se recomienda hacer aplicaciones preventivas cuando la enfermedad está en etapas iniciales, es importante mantener una buena humedad del terreno para el buen desempeño del Fungicida se recomienda realizar las aplicaciones a tempranas horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.40	14	6

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una única aplicación durante el desarrollo de las hojas.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas

COMPATIBILIDAD:

NUZOLE SC es incompatible con soluciones alcalinas fuertes, genera reacciones de descomposición.

FITOTOXICIDAD:

NUZOLE SC, usado a las dosis indicadas en el cuadro de instrucciones de uso, no presenta problemas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta, y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

