

20 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Ditiocarbamato + Cyanoacetamida oxime**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar de beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 08001-3040 CROP BUSINESS SAC: 349-2669
ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya los envases y depositelos en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera de la zona tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CYMONEB 78 PM es un fungicida de amplio espectro de acción protectante y curativa, para el control de "Hielo" o "Rancho" en el cultivo de papa y de "Mildiu" en cebolla.

CYMONEB 78 PM es una mezcla de dos fungicidas: Propineb que actúa interfiriendo en diferentes ubicaciones en el metabolismo de los hongos que es complementada con el efecto del Cymoxanil que actúa inhibiendo el crecimiento del patógeno en las hojas tratadas, dañadas e impide el desarrollo de los haustorios.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

El momento oportuno de su aplicación será cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Para el cultivo de papa considerar máximo dos (02) aplicaciones por campaña, una (01) campaña al año. Para los cultivos de cebolla y tomate, considerar máximo una (01) aplicación por campaña, dos (02) campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CYMONEB 78 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidantes.

FITOTOXICIDAD

CYMONEB 78 PM no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Papa	"Rancho" o "Hielo"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.3* 0.05**
Cebolla	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	0.4-0.5	7	0.05* 0.05*
Tomate	"Rancho" o "Hielo"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4-0.5	7	3.0* 0.2**

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos: *Propineb; **Cymoxanil



20 cm

CYMONEB

78 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Propineb 700 g/kg
 Cymoxanil 80 g/kg
 Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg PQUA N° 1606 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS SAC



Av. Melgarejo N° 580 Dpto 301
 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima
 Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 25 Kg

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD

N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

30 cm

30 cm