

Fab.: PILARQUIM - PC: 28

Etiqu. Sticker BENLAFARM x 100gr y 200gr 14.5cm x 21.5cm

07.07.16

BENLAFAR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Fungicida Agrícola

Polvo Mojable (WP)

COMPOSICION QUIMICA:

Benomyl500 g/kg
Aditivosc.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 261- SENASA

Titular del Registro , Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 614-1500 Fax: 614-1517

FARMAGRO S.A. 

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fabricante:

Pilarquim (Shangai) Co., Ltd.

Shanghai CHINA



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.



**Moderadamente peligroso
DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo o aspersión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora (sombrero, lentes protectores, mascarilla, overol, guantes y botas de hule) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- BENLAFAR debe mantenerse alejado del fuego y/o chispas.
- Lave el equipo de aplicación y de protección después de cada jornada.
- No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: benzimidazoles
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: Provoque el vómito dando a tomar jarabe de ipecacuana, seguido de uno o dos vasos de agua con sal o introduciéndole el dedo en la boca, tocándole la base de la lengua.
- Nunca de a beber, ni induzca el vómito a personas en estado de inconciencia.
- En caso de inhalación: Retire al paciente del área contaminada, manténgalo en reposo y vigile su respiración.
- En caso de contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste consultar con el oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.

Antídoto:

No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de fortalecimiento general, vigile los signos vitales y la respiración.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN: CICOTOX: 0800-1-3040, ALÓ ESSALUD 0801-10-900 (LAS 24 HORAS)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para éste fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación de sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BENLAFAR es un fungicida sistémico de propiedades preventivas y curativas en muchos cultivos. Se usa mezclado con agua a las dosis recomendadas específicamente para el correspondiente cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS por Cilindro de 200 litros	ULTIMA APLICACION A LA COSECHA (días)	LIMITE MAXIMO RESIDUOS (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
TOMATE	Botritis	Botrytis cinerea	200 g	3	5
APIO	Cercospora	Cercospora apii	200 g	28	2

n.d. : No determinado L.M.R. : Límite máximo de residuos ppm: partes por millón
 P.C.: Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar cada 10 a 12 días cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: BENLAFAR es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: BENLAFAR no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

