

0.5 cm

0.5 cm

18.0 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Spock

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN:

Methomyl 900 g/kg
 Aditivos c.s.p.1kg

VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es TÓXICO. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire el polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, forrajes ni medicinas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: carbamato.

• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.

• En caso de ingestión, no inducir al vómito. Llamar a un médico o a un centro de información toxicológica. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

• En caso de inhalación, mover a la persona al aire libre. Dar respiración artificial si es necesario. Llamar a un médico o llevar a un centro médico.

• En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Manténgase los ojos bien abiertos mientras se enjuaga. Consulte con un médico.

• En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar y eliminar toda la ropa y zapatos contaminados.

• **Teléfonos de emergencia: CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.**

NOTA AL MÉDICO:

Antídoto: atropina, que se puede administrar como sulfato de atropina.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos beneficios.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de las abejas.
- Aplicar temprano en la mañana o en las tardes. Evitar la deriva por el viento
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPOCK es un insecticida que pertenece al grupo de los carbamatos a base de methomyl. Actúa por contacto e ingestión y tiene actividad sistémica en la planta.

SPOCK se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Plaga		Dosis kg/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Alcachofa	Gusano barrenador	<i>Heliothis virescens</i>	0.1 - 0.15	7	0.02
Brócoli	Polilla dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.1	7	0.02
	Espárrago	<i>Trips</i>	<i>Thrips tabaci</i>	0.1 - 0.15	1
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	7	0.02
Palto	Chinche del palto	<i>Dagbertus minesis</i>	0.15 - 0.2	1	2
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.1 - 0.2	3	2
Tomate	Gusano del fruto	<i>Spodoptera eridania</i>	0.15 - 0.2	7	1

P.C.: período de carencia en días. L.M.R.: límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La aplicación debe contemplar los niveles de daño económico de la plaga, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar el momento de aplicación. Se recomienda aplicar SPOCK (i.a. methomyl) 01 aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año para todos los cultivos del cuadro de usos.

PERIODO DE REINGRESO. No ingresar al área tratada durante las 48 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD. SPOCK es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD. No se ha observado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 3
 San Isidro, Lima 27 - PERU
 Teléfono: (01) 630-6400
 www.farmex.com.pe

Reg PQUA N° 1351 – SENASA

Formulado por:

SINOCHEM AGRO CO., LTD.
 18-19th No. 33 Henan Road(s),
 Shanghai 200002, China.

Lote N° :

F. Form. :

F. Venc. :

CONTENIDO NETO: 1 kg

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**ALTAMENTE PELIGROSO
 TÓXICO**



0.5 cm

22.0 cm

3.3 cm

línea
de semicorte
(troquel)