

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Spock

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Methomyl..... 900 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es TÓXICO. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire el polvo o aspersión.
- No comer, fumar o beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: carbamatos.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Llamar a un médico o a un centro de información toxicológica. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, mover a la persona al aire libre. Dar respiración artificial si es necesario. Llamar a un médico o llevar a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Manténgase los ojos bien abiertos mientras se enjuaga. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar y elimine toda la ropa y zapatos contaminados.

Teléfonos de emergencia: INFOSALUD 0800-10-828, CISPROQUIM: 080-050-847.

NOTA AL MÉDICO:

Antídoto: atropina, que se puede administrar como sulfato de atropina.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de las abejas.
- Aplicar temprano en la mañana o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPOCK es un insecticida que pertenece al grupo de los carbamatos a base de methomyl. Actúa por contacto e ingestión y tiene actividad sistémica en la planta.

SPOCK se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS kg/cil (200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Alcachofa	Gusano barrenador	<i>Heliothis virescens</i>	0.1 - 0.15	7	0.02
Brócoli	Polilla dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.1	7	0.02
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1 - 0.15	1	2
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	7	0.02
Palto	Chinche del palto	<i>Dagbertus minensis</i>	0.15 - 0.2	1	2
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.1 - 0.2	3	2
Tomate	Gusano del fruto	<i>Spodoptera eridania</i>	0.15 - 0.2	7	1

P.C.: período de carencia en días. L.M.R.: límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La aplicación debe contemplar los niveles de daño económico de la plaga, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar el momento de aplicación. Se recomienda aplicar SPOCK (i.a. methomyl) 01 aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año para todos los cultivos del cuadro de usos.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada durante las 48 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SPOCK es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del registro: FARMEX S.A.

Reg. PQUA N° 1351-SENASA

CONTENIDO NETO: 1 kg

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU.
Teléfono: (01) 630-6400.
Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

Número de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

Formulado por:
SINOCHEM AGRO CO., LTD.
18-19th No. 33 Henan Road(s),
Shanghai 200002, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

