

	ETIQUETA	Revisión: 00 Aprobado: JR Fecha: 04-07-16 Página: 8 de 10
	FORTAK 300 WP - NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.	

12,0 +/- 0,3 cm

1,5 ± 0,3 1,5 ± 0,3



FORTAK[®]
300 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo mojable - WP

Composición:
Triflumizole : 300 g/kg
Aditivos : c.s.p.1kg

Registro N° 1599 - SENASA



Titular de Registro: **Importado y Distribuido por:**

SILVESTRE PERÚ S.A.C. **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 617-3300

Contenido Neto: 300 g **Formulado por:**

N° de Lote: **NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**
F. de Form.: 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
F. de Venc.: Nanjing 211100 CHINA.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Medidas en cms.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir. Evite el contacto con la piel y ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Almacenar el producto bajo techo en lugar fresco, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Insecticida

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona por vía oral si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 325 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-96847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- FORTAK[®] 300 WP** es un fungicida sistémico que tiene por ingrediente activo al Triflumizole, con acción preventiva y curativa. Inhibe la biosíntesis de ergosterol, el cual es un componente de la membrana celular en hongos; provoca la inhibición de la germinación de esporas, el crecimiento micelial y la propagación del hongo dentro de la planta.
- FORTAK[®] 300 WP** se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (motocicla a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentran en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Para vid, se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiere ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD
FORTAK[®] 300 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas, agentes oxidantes, alcalinos, ácidos y cobre. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
FORTAK[®] 300 WP no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Cuadro de usos: **"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
VID	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	50	7	3

PC: Período de Carencia (días). LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).

