

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimenticios, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico, y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está inconsciente lavar la boca con agua, inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continúa, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Consulte con un médico.
- **Nota al médico: Antídoto:** No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y terapia complementaria.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
 CICOTOX: 0800-130440 / 328-7396 (atención 24 horas)  
 ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita) CISPROMQUIM: 0800-050847 (atención 24 horas)  
 ADAMA Agriculture Perú S.A.: (01) 641-0000

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



ADAMA

**Bumper® Top**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
 EMULSIÓN CONCENTRADA (EC)

**COMPOSICIÓN**

Propiconazole ..... 250 g/L  
 Difeconazole ..... 250 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1613-SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

**Formulado por:**

**ADAMA Andina B.V.**  
**Sucursal Colombia.**  
 Calle 1C N° 7-53 Int Zona Franca  
 Barranquilla, Colombia.

**Importado y Distribuido por:**

**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
 Av. El Derby N° 254 Of. 503.  
 Santiago de Surco. Lima - Perú.  
 Teléfono: (01) 641-0000

Contenido neto: **500 ml**

Lote No.  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Bumper Top** es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo de amplio espectro de acción, alta eficacia y prolongado efecto residual.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO | ENFERMEDAD   | DOSIS (L/Ha) | PC (días) | LMR (ppm)                         |
|---------|--|--------------|-----------|-----------------------------------|
| Arroz   | "Quemado del Arroz"<br>( <i>Pyricularia oryzae</i> ) | 0.2          | 35        | 7 <sup>1</sup> / 3 <sup>2</sup>   |
| Vid     | "Oidium"<br>( <i>Erysiphe necator</i> )              | 0.075        | 42        | 4 <sup>1</sup> / 0.3 <sup>2</sup> |

LMR.: Límite Máximo de Residuos (en partes por millón). 1-Propiconazole / 2-Difeconazole  
 P.C.: Período de Carenacia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.  
 Intervalo mínimo entre aplicaciones: 21 días para arroz, 15 días para vid.  
**Arroz:** Iniciar las aplicaciones de forma preventiva cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo del patógeno o en estados iniciales de la enfermedad.  
**Vid:** Realizar la aplicación cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, (no mayor del 5% de incidencia). Aplicar durante desarrollo vegetativo a fructificación.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD**

En caso de mezclas con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones : 230 mm x 120 mm

Esta etiqueta requiere Hoja Informativa