

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimenticios, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico, y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está inconsciente lavar la boca con agua, inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continúa, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Consulte con un médico.
- **Nota al médico: Antídoto:** No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
 CICOTOX: 0800-130440 / 328-7396 (atención 24 horas)
 ESSALLUD: 0801-10200 (línea gratuita) CISPROMQUIM: 0800-050847 (atención 24 horas)
 ADAMA Agriculture Perú S.A.: (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



ADAMA

Bumper® Top

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
 EMULSIÓN CONCENTRADA (EC)

COMPOSICIÓN

Propiconazole 250 g/L
 Difenconazole 250 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1613-SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Formulado por:

ADAMA Andina B.V.
Sucursal Colombia.
 Calle 1C N° 7-53 Int Zona Franca
 Barranquilla, Colombia.

Importado y Distribuido por:

ADAMA Agriculture Perú S.A.
 Av. El Derby N° 254 Of. 503.
 Santiago de Surco. Lima - Perú.
 Teléfono: (01) 641-0000

Contenido neto: **500 ml**

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Bumper Top es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo de amplio espectro de acción, alta eficacia y prolongado efecto residual.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Arroz	"Quemado del Arroz" (<i>Pyricularia oryzae</i>)	0.2	35	7' / 3²
	"Chupadera fungosa" (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.25-0.30		

LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón). 1-Propiconazole / 2-Difenconazole
 P.C.: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.
 Intervalo mínimo entre aplicaciones: 15 días (*Rhizoctonia solani*) y 21 días (*Pyricularia oryzae*).

Momento de aplicación

"Quemado del arroz": Iniciar las aplicaciones de forma preventiva cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo del patógeno o en estados iniciales de la enfermedad.

"Fuego de la vaina foliar": Aplicar desde macollamiento hasta inicio de punto de algodón. Emplear la dosis más baja en aplicaciones preventivas o cuando se reporten los primeros síntomas de la enfermedad (no mayor del 5% de incidencia). Emplear la dosis más alta cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa o presencia de lluvias).

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

En caso de mezclas con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones : 230 mm x 120 mm

Esta etiqueta requiere Hoja Informativa