

# Gendarme® 20 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRANULO SOLUBLE (SG)**

**COMPOSICIÓN:**

Dinotefuran.....200 g/kg

Aditivos .....c.s.p. 1kg

**Nº DE REGISTRO: PQA Nº - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:  
CAPEAGRO S.A.C.**



**FORMULADO POR:**

**OASIS AGROSCIENCE LIMITED**  
Room 1510, N°500 Xinjiang Road,  
Shanghai CHINA

**IMPORTADOR Y  
DISTRIBUIDOR:**

**CAPEAGRO S.A.C.**  
Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E.  
Miraflores - Lima  
Tlf.: 4455346 - [www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

**Contenido  
Neto: 1 kg**

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

# LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## “MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en la primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evite almacenar por encima de los 35°C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

### TELEFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)  
CICOTOX: 0800-13040  
CAPEAGRO S.A.C.: 445-5346

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para las abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en la mañana o muy entrada la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **GENDARME 20 SG** es un insecticida neonicotinoide. Es sistémica, de contacto e ingestión y afecta el sistema nervioso central de los insectos. Dinotefuran es un agonista de los receptores nicotínicos de la acetilcolina.

- El producto se emplea en campo, mediante método de aspersión foliar, empleando equipos de aplicación terrestre como pulverizadora manual o bomba de mochila.

- Modo de preparación: Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **GENDARME 20 SG**, luego de completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de vid, aplicar a inicios de infestación, durante las primeras horas del día o al atardecer. Realizar máximo dos (02) aplicaciones por campaña, 01 campaña al año.

### PERIODO DE REINGRESO

Después de 24 horas.

### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico			
Vid	“Chanchito blanco”	<i>Planococcus citri</i>	1.0	28	0.9

\*P.C.: Periodo de Carenia

\*\*L.M.R.: Límite máximo de residuos

