

MICLONIL[®] 40 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Myclobutanil..... 400 g/Kg
Aditivosc.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



**Importador y
Distribuidor:**

CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

FORMULADO POR:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED.
Room 1510, N°500 Xinjiang Road,
Shanghai CHINA

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **500 g**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de dañino no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en la primeras 36 horas.
- Después de la aplicación, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes o semillas.
- Almacenar el producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Mantenga alejado el producto del alcance de los niños.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazole

- En caso de ingestión: Llame o acuda a un médico inmediatamente y de información de la etiqueta. No inducir al vómito a no ser que sea voluntario o recomendado por el médico.
- En caso de inhalación: Llevar al paciente a un lugar sombreado, con aire fresco. Si no respira, brindar respiración artificial boca a boca. Solicitar asistencia médica.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Si la irritación persiste, acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. Si la irritación o dolor persiste, acudir al médico.
- Este producto no tiene antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

Llamar a: CICOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD: 0801-10200.
CAPEAGRO: 445-5346.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MICLONIL 40 WP es un fungicida de sistémico contra oidium en diversos cultivos. Actúa alterando la membrana celular, impidiendo la síntesis de ergosterol, al extraer un grupo C¹⁴-metilo al 24-metilenedihidrolanosterol. **MICLONIL40 WP** inhibe este paso e interrumpe la síntesis de aquel compuesto que forma parte de la membrana celular de los hongos

Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **MICLONIL 40 WP**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar dos aplicaciones al año, cuando la plaga esté presente.

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso al área tratada es de 36 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	Kg/200L de agua	Kg/Ha		
Paprika	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	--	0.3-0.4	2	0.5
Vid	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	0.024-0.040	--	14	3

*P.C.: Periodo de carencia

**L.M.R.: Límite máximo de residuos

