



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Iprodione : 500 g/kg
Aditivos : c.s.p.1kg

Registro PQUA N° 311 - SENASA



Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 200 g

Formulado por:

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road,Jiangning Dis.
Nanjing 211100 China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboximida
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Cuadro de usos: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L	kg/ha		
AJO	"Pobredumbre blanca"	<i>Sclerotium cepivorum</i>	400	-	21	0.2
ALCACHOFA	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5	14	0.05
CEBOLLA	"Moho gris"	<i>Botrytis sp.</i>	-	0.8	14	0.20
FRESA	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	750	-	7	10
MANDARINA	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	200	0.50	30	1
MANZANO	"Pudrición de las flores"	<i>Botrytis cinerea</i>	250	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.5	14	0.02
PALTO	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	300	-	14	0.01
TOMATE	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	200	-	7	0.5
VID	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.00	5	0.45

PC: Período de Carenia (días).

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- YARDA® 500 WP es un fungicida de contacto y preventivo desarrollado para el control de Botrytis cinerea en el cultivo de mandarina.
- YARDA® 500 WP actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.
- YARDA® 500 WP puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de YARDA® 500 WP cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 1.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

YARDA® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas, ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

YARDA® 500 WP no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

