**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:**
- Éste producto es CUIDADO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de ingestión llamar al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagarlos con abundante agua limpia por 15 minutos. Conseguir atención médica.
- En caso de contacto con la piel: Remover toda la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón. Conseguir atención médica.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona al aire fresco. Dar respiración. Buscar atención médica

**NOTA AL MÉDICO**
- No hay antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

**Teléfonos de EmergenciaToxicológica**
ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)
CICOTOX: 0800-13040( Atención las 24 horas)

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fín.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio ddestinado por las autoridades locales para éste fin..
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.

# EPOXIL

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICION:**
Epoxiconazole..... 125 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1L

**Registro PQUA N° .....-SENASA**

**Titular del Registro, Importador y Distribuidor:**
**FARMAGRO S.A.**
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

**Formulado por:**
**Flagchem International Co., Ltd.**
29 F, Soho Masion, No. 8, South Zhongshan Road,
Nanjing, China

**CONTENIDO NETO:**
**Número de Lote: 500 ml**
**Fecha de Formulación:**
**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**
**EPOXIL** es un fungicida sistémico y translaminar,usado para el control de Hemileia vastartix en café. El Epoxiconazole inhibe la biosíntesis del ergosterol, el cual es un componente de la membrana celular del hongo.

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad del tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme al follaje.
Utilizar cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual o atomizadora, siempre y cuando se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo como vacío).

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | LMR ppm | PC días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | ml/200L | L/ha | | |
| Café | Roya del cafeto | *Hemileia vastatrix* | 200 | 0.48 | 0.05 | 35 |

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:**
Debe ser aplicado de forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Efectuar máximo una aplicación/campaña/año para el cultivo objetivo.

**PERIODOS DE REINGRESO:**
No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**
EPOXIL, puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.

**FITOTOXICIDAD:**
No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**