

**FUNGIGOLD etiqueta sticker para bolsa de 1 kg.
(18.5 x 33.5cm) TIRA**

FUNGIGOLD

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Fungicida Agrícola

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Dimethomorph.....	90 g/kg
Mancozeb	600 g/kg
Aditivos	c.s.p 1kg

Registro PQUA N°1624 - SENASA

Titular del Registro , Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 614-1500 Fax: 614-1517

FARMAGRO 

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

Shanghai E-Tong Chemical Co. Ltd.

N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District

Shanghai, China

Contenido Neto: 1 kg.

Número de lote:

Fecha de Formulación::

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de FARMAGRO S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

—

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Cusa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas persona.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (use guantes, botas, overol de dos piezas, careta de protección, y tapabocas), y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos y agua para consumo humano.
- Evite aspirar la neblina de aspersión.
- Realice siguiendo la aplicación del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Dimethomorph (Acido cinámico) Mancozeb (Ditiocarbamato)
En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente a un Centro Médico, mostrar la etiqueta o envase original.

Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral a una persona inconsciente.

En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lávarlos con abundante agua durante 15 a 20 minutos.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Lave la piel con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y lleve al paciente al aire fresco. Si la persona no esta respirando, suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte un médico.

NOTA AL MEDICO: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:

CICOTOX: 0800-13040 (Atención 24 horas)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

GENERALIDADES:

FUNGIGOLD, es un fungicida de contacto, superficial, protectante, sistémico, curativo y antiesporulante.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Se recomienda usar FUNGIGOLD, según las dosis detalladas en el cuadro de usos específicos.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una mezcla uniforme. Luego, vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar máximo 2 aplicaciones por campaña/año, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción fuertemente alcalina, además de ser incompatibles con agentes oxidantes y ácidos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos.

FITOTOXICIDAD: No ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.”

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	LMR (ppm)	PC* (días)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/ha		
Papa	Hielo o Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.05 (Dimethomorph) 0.2 (Mancozeb)	7 (Dimethomorph) 14 (Mancozeb)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm)

***Periodo de Carencia:** Intervalo entre la ultima aplicación y la cosecha (días).

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	LMR (ppm)	PC* (días)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/ha		
Papa	Hielo o Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.05 (Dimethomorph) 0.2 (Mancozeb)	7 (Dimethomorph) 14 (Mancozeb)

***Periodo de Carencia:** Intervalo entre la ultima aplicación y la cosecha (días).

