

# CAMPO - CYMOZEB

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

POLVO MOJABLE - WP

## COMPOSICIÓN:

Cymoxanil ..... 80 g/kg  
 Mancozeb ..... 640 g/kg  
 Aditivos ..... c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N°1630 - SENASA

## Titular del Registro:

**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**

Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.

Teléfono: + 51 -1 - 222-2795

## Formulado por:

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**

Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

## Importado y distribuido por:

**SANIVÉG PERU S.A.C.**

CALLE 4 MZ. B1 LOTE 22 (AV. SAN GENARO 235)

Urb. Lotización Industrial, Puente Piedra, Lima - Perú.

Teléfono: + 51 - 1 - 016371269

Celular: + 51 - 959292596

N° Lote:

F. de Form:

F. de Venc:

**GENERIC**  
 your exclusive agrochemical partner

**SANIVÉG PERU**  
 SAC

CONTENIDO NETO: 200 g.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR  
 EL PRODUCTO”**

**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Este producto es de CUIDADO. No ingerir”

“Evite el contacto con la piel y la ropa”

“Causa irritación moderada a los ojos”

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”

“Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado”

“Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados”

“No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas,  
 bebidas ni forrajes”

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al  
 área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación”

“Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese  
 con abundante agua y jabón”

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para  
 conservar alimentos o agua para consumo”

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

**CICOTOX: 0800-13040 / ESSALUD: 0801-10200**

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| Cultivo | Plaga           |                               | Dosis           |            | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
|         | Nombre<br>común | Nombre<br>científico          | Cil 200<br>(kg) | Ha<br>(kg) |                |                 |
| Cebolla | Mildiu          | <i>Peronospora destructor</i> | 0.5             | 1.0        | 7              | 0.05*<br>1.0**  |

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

\* Cymoxanil \*\* Mancozeb

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad del  
 cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

