Fecha: 14-07-16 Página: 3 de 6

1.0 ± 0.3

 $48.0 \pm 0.3 \text{ cm}$

BUONARROZ 60% CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

PQUA Nº

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

ne agrum

Pj. Camino de Acceso Nº 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla

Lurigancho - Lima - perú. Teléfono: 617-6400

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVENTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 Este protucto es de cutado, no rigera:
 Este protucto es de cutado, no rigera:
 Este protucto es de cutado, no rigera:
 Este protucto este de cutado, no rigera:
 Corresion el fortudo de nel encesa carganal elequiados o y carrado.
 Unition cropa protectora durante la mampulación y apricación y para impresar al área tratada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

- de la aplicación.

 Almacener al producto bajo techo en ambentes fiescos secos y ventilados.

 No almacener al producto bajo techo en ambentes fiescos secos y ventilados.

 No almacener in transportire computamente con almentos medionas botodas in forrajes.

 Desputas de user al producto, cómbios al user la ropo contensa dy bajos en anterio de gua para consumo Desputas de user al producto, combios al user la ropo contensa dy bajos en a buridante agua y pibón.

 Resizar la aplicación os guarnos de indechon del ventro.

- Resized a spicialization segmentation or unaccount or weather programments.

 Grupo Quinnitor: Childroscettamida.

 Grupo Quinnitor: Grupo Quinnitori or del programmento quinnitori or del programmento del Consulte a un médico NOTA AL MEDICO No posee antidoto el tratamiento es sintomático y de soporte

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 328 7700, NEOAGRUM SAC: 617 - 6400 ESSALUD: 0801 - 10200 (LÍNEA GRATUITA) CISPROQUIM: 0800-50847

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCRIJOS. VOOI 1 RUROU (ILINEA GARTILITA).

 Después de tear el contiendo, enjuegos intervense sete envese, vienta de contiendo, enjuegos intervense sete envese, vienta depositale on en lugar destinado por las allundades contes para este en Federal depositale on en lugar destinado por las allundades contes para este fene Realizar obligationamente el Implé lavado del presente envese.

 Devuelva el envese implé lavado al centro de accopo autorzado Devuelva el envese intervense mentre en la centre de acceptante envese.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Edigloro para regimento e acutar. Contacto vivilioni del carriori del controlori del controlori

F. de Form. F. de Venc

NO CORROSIVO

Contenido neto: 10 L





NO EXPLOSIVO

Formulado por: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD

6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shenshua Road 750R, Jiman, Shandong, CHINA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BUONARROZ 60% CE es un herbicida líquido, recomendado en aplicaciones preemergentes demalezas en el cultivo del arroz

So recominants para el control de materia cominante para el materia de la productiva premiegranes dentenizas en el cultivo del arroz. Se recominante para el control de materia granimese, premieras y algunes de loga anche, en servintos de transplante Artes de usar el producto, aglitese bien el encase cerado. BUONARROZ 69% CE es fiol de preparar; basta verter la doses recomendada en agua que permiera dosteren una emistrado informe, buego se completa con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación de souercó a la calibración y siempre agitando a efecto de mantiener la emistión.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Cientifico	L/ha	(dias)	(ppm)
Arroz	Rabo de zorro	Leptochloa uninervia	50	N A	-0.1
	Cebadilla	Echinochloa colona			
	Moco de pavo	Echinochloa crusgalli			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Pata de gallina	Eleusine indica			
	Cadillo	Cenchrus echinatus			
	Yuyo o bledo	Amaranthus viridis			
	Coquito	Cyperus rotundus			

PC Periodo de carencia (días)

N.A. No aplica LMR Limites máximos de residuos (ppm partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda En siembra directa, aplicar el producto después de la siembra de arroz.

En transplante, aplicar la dosis recomendada de BUONARROZ 60% CE de a 1 a 4 días después de realizado el transplante, antes que las matezas

-Aplicar BUONARROZ 60% CE (i a Butachlor) una aplicación por campaña, como máximo

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el produdo En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección

COMPATIBILIDAD: BUONARROZ 60% CE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad

FITOTOXICIDAD: BUONARROZ 60% CE no es fitotóxico en los culivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la eliqueta RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantza que les características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con lascondiciones e instrucciones dadas.





LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO





LOGO NEOAGRUM Envase PEAD

TRIPLE LAVADO

PANT. 343 C PANT. 377 C PANT. 1375 C

COMPOSICIÓN: Aditivos.









CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

(2

1.0 ± 0.3