14.5 ± 0.3

ne agrum	ETIQUETA	Revisión: 00 Aprobado: JR
	BUONARROZ 60% CE - SINOCHEM AGRO CO.LTD.	Fecha: 14-07-16 Página: 6 de 6

48.0 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 Este producto en de cuidaço, no ingerir
 este producto en entre en

- PRIBERGO AUTORIO de televida.

 Final Quillico: Chiproce chardia.

 Final Quillico: Properti de consideration de considera
- Consulte a un médico. NOTA AL MEDICO: No posee antidoto, el tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 328 7700, NEOAGRUM SAC: 817 - 8400 ESSALUD: 0801 - 10200 (LÍNEA GRATUITA) CISPROQUIM: 0800-50847

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

 Después de usar el contenido, enjuague tera vecas este envase, vienta
 esta el contenido, enjuague tera vecas este envase, vienta
 deposible en el lugar destando por las aludoridade locales para este
 faccialidar a lugar destando por las aludoridade locales para este
 fa Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
 Devuelva el efraves triple lavado al centro de acoppo autorizado
 Devuelva el efraves triple lavado al centro de acoppo autorizado

 en el composições de la composições de la composições de la composições

 en el composições de la composições de la composições
 en el composições de la composições
 en el composições de la composições
 en el compo

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
 Peligroso para organismos acuálicos, plantas acualizas y semi acuálizas
 Peligroso para organismos acuálicos, plantas acualizas y semi acuálizas
 No contaminar info, estánques o respecto para de la recolación
 No contaminar info, estánques para de la recolación
 Respeta una banda de no aplicación haca cuerpos de agua de el menos 5 metros
 Peligroso para los amunales dometicas, clama y filoso sixiente los pomitir ammales en el tieres tratada
 El aplicación debe empleas fodes tes medidas concesares para curribar la deriva
 El contra de contra de concesares para curribar la deriva
 El aplicación debe empleas fodes tes medidas en el tiene de celebración por las subordades para tal fin



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN: Butachlor..... Aditivosc.s.p. 1 L

PQUA Nº

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



Pj. Camino de Acceso Nº 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla

Contenido neto: 100 L

Nº de Lote: F. de Form. F. de Venc.

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

Formulado por: SINOCHEM AGRO CO, LTD, 17-19 th Floor, N°33, Henan Road(S) Shanghai - CHINA

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BUONARROZ 60% CE es un herbicida líquido, recomendado en aplicaciones preemergentes de malezas en el cultivo del arroz

Se recomienda para el control de malezas gramíneas, ciperáceas y algunas de hoja ancha, en siembras de transplante

Antes de usar el producto, agilese bien el envase cerado BUONARROZ 60% CE es fácil de preparar; basta verter la dosis recomendada en agua que permita obtener uma emulsión uniforme, luego se ecompleta con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación de acuerdo a la calibración y sempre agilando a efecto de manitaner la emulsión

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Cientifico	L/ha	(dias)	(ppm)
Arroz	Rabo de zorro	Leptochloa uninervia	50	NA	01
	Cebadilla	Echinochloa colona			
	Moco de pavo	Echinochloa crusgalli			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Pata de gallina Cadillo	Eleusine indica Cenchrus echinatus			
	Yuyo o bledo Coquito	Amaranthus viridis Cyperus rotundus			

PC Penodo de carencia (días) N.A. No aplica LMR Límites máximos de residuos (ppm. partes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda

PRECUENCIA TECCUA DE APILIAMONIS SE RECOMIEnta.

En sembra directa, aplicar el productio después de la siembra de arroz.

En transplante, aplicar la dosis recomendada de BUONARROZ 60% CE de 1 a 4 días después de realizado el transplante, antes que las malezas.

hayen emergido

Aplicar BUCNARIOZ 60% CE (i.e. Bulachlof) una aplicación por campaña como máximo

PERIODO DE REBINARISOZ 60% CE (i.e. Bulachlof) una aplicación por campaña como máximo

PERIODO DE REBINARISOZ 60% Puede renguesar el campo 24 horas después de aplicado de producto. En caso se requiera ingresar al campo aniles de

cuapitiós este period, obderé sare equipo de profescion.

COMPATIBILIDAD: BUONARROZ 60% CE es compatible con la mayor la de plaguicidas de uso comun excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad

FITOTOXICIDAD: BUONARROZ 60% CE no es filotóxico en los cutivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la eliqueta RESPONSABILIDAD CIVII ·

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la eliqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**





CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

 1.0 ± 0.3