



ETIQUETA

BUONARROZ 60% CE - HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD

Revisión: 00
Aprobado: JR
Fecha: 14-07-16
Página: 5 de 6

48.0 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.3

1.0 ± 0.3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso a los inhalados. Evite respirar la nebulación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese (lave) la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Cloracetamida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. De continuar con el problema, consulte a un médico.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada, lavar con abundante agua.
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Aplicar respiración artificial de ser necesario. Consulte a un médico.
- NOTA AL MEDICO: No posee antídoto, el tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 322 7700 NEOGRUM SAC: 817 - 6400
ESSALUD: 0801 - 10200 (LINEA GRATUITA) CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego multilado perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realice cuidadosamente el triple lavado del presente envase.
- Devuélvase el envase triple lavado al centro de accepo autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los residuos de la aplicación o sobranjes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

BUONARROZ 60% CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Butachlor..... 600 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

PQUA N°

Titular del Registro, importado y Distribuido por:



PJ. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 817-6400

Contenido neto: 200 L

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town,
Hangzhou, Zhejiang Province - CHINA

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BUONARROZ 60% CE es un herbicida líquido, recomendado en aplicaciones preemergentes de malezas en el cultivo del arroz. Se recomienda para el control de malezas gramíneas, opóideas y algunas de hoja ancha, en siembras de trasplante. Antes de usar el producto, agítelo bien en el envase cerrado. BUONARROZ 60% CE es fácil de preparar, basta verter la dosis recomendada en agua que permita obtener una emulsión uniforme, luego se completa con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación de acuerdo a la calibración y siempre agitando a efecto de mantener la emulsión.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

Table with columns: CULTIVO, Nombre Común, Nombre Científico, DOSIS (L/ha), P.C. (días), L.M.R. (ppm). Rows include Arroz with various weed names like Rábano de zorro, Cebadilla, etc.

PC: Período de carencia (días) N/A No aplica LMR Límites máximos de residuos (ppm partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda

-En siembra directa, aplicar el producto después de la siembra de arroz.
-En trasplante, aplicar la dosis recomendada de BUONARROZ 60% CE de 1 a 4 días después de realizado el trasplante, antes que las malezas hayan emergido.

-Aplicar BUONARROZ 60% CE (a Butachlor) una aplicación por campaña como máximo.

PERÍODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: BUONARROZ 60% CE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: BUONARROZ 60% CE no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

14.5 ± 0.3 cm

2.2 cm

03001