ETIQUETA

48.0 ± 0.3 cm

Revisión: 00 Aprobado: JR

BUONARROZ 60% CE - SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED

Fecha: 14-07-16

Página: 5 de 6

1.0 ± 0.3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- ***PECALICIONES** A DIVERTIFICIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 Esté producto es de cultado, no rigare la especiación
 Esté producto es de cultado, no rigare la especiación
 Cordenar el producto en el envesão roginal elequadado y cerado
 Utilica roga profector durante la mampitación y aplicación y para ingresar al área tratació durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

 de la aplicación dudo la cipa techo en ambientes frescos, asoco y vertiliado.

 No altracient in interportal consultamente o confiención, entendenas bebados, no forages.

 Ningún envises que haya cordenado plaguada debe dultizate para consesivar alimento o apus para consumo Después de usa el porculor deriberado la este la roga continentado y bafinese con abundarife agúa y jabón.

 No came, baber o furme durante las operaciones de mazolas y apricación.

- PRIMEROS AUXILOS

 Grupo Guintico: Chicroscotta idea.

 France Control Chicroscotta idea.

 France Chicroscotta control cont Consulte a un médico.

 NOTA AL MEDICO: No posee antidoto, et tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 328 7700 NEO AGRUM SAC: 617 - 6400 ESSALUD: 0801 - 10200 (LINEA GRATUITA) CISPROQUIM: 0800-50847

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECTIOS CRUTO (LINEA GRATUTA)

 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECTIOS Y ENVASES VACIOS:

 Después de usar el contento, enjuegue trea veces este envase, veria
 esta porta de la lugar destinación la lugar comitación por describación y
 esposible on el lugar destinación la lugar comitación de la lugar destinación de la lugar destinación de la lugar destinación de la comitación de presente envase en la respectiva de comitación de la comitación de

- WEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVAÇIÓN DEL AMBIENTE:
 Pelligropo para organemos acualizos, parillas assulfaces y sem acualizoses
 Pelligropo para organemos acualizos, parillas assulfaces y sem acualizoses
 No contiemna les harilles de agua con foir certado de la paracetar o actorizarios está producto
 Respelar um banda de no aplicación haça cuespos de agua de al menos 5 meticos.
 Pelligropo para les amentes combientos, calmar y filoras devidere los poremites amentes en el área tratada
 Pelligropo para les amentes combientos, calmar y filoras devidere los poremites amentes en el área tratada
 En caso de distrama le seoger el producto y depositario en el elho destinado por las autoridades para las fin

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICION:		
Butachlor	600	g/L
Aditivos	.s.p.	1 L

PQUA N°

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



Pj. Camino de Acceso Nº 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla Formulado por: SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED 29 Xiaohang Road, Narijing CHINA

Contenido neto: 200 L Lurigancho - Lima - perú. Teléfono: 617-8400

F. de Form. F. de Venc



NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BUONARROZ 69% CE es un herbicida líquido, recomendado en aplicaciones preemergentes de matezas en el cultivo del arroz Se recomienda para el control de matezas gramíneas, ciperáceas y algunas de hoja ancha en siembras de transplante

Anles de usar el producto, aglises bien el enviseo cerrado BUOMARROZ 60% CE es fácil de preparar, besta verter la dosis recomendada en agua que permita ciblenar una emulador uniforma, luego ao competa con agua hasta alcanizar el volumen de aplicación de acuardo a la calibración y siempre ogliando a electo de maritane la emulación

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C.	L.M.R	
	Nombre Común	Nombre Cientifico	L/ha	(dias)	(ppm)	
Аггоz	Rabo de zorro	Leptochloa uninervia				
	Cebadilla	Echinochloa colona				
	Moco de pavo	Echinochloa crusgalli	50	N.A.		
	Verdolaga	Portulaca oleracea			01	
	Pata de gallina	Eleusine indica	""	1981		
	Cadillo	Cenchrus echinatus				
	Yuyo o bledo	Amaranthus viridis				
	Coquito	Cyperus rotundus				

PC Penodo de carencia (días) N.A. No aplica LMR Límites máximos de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda
-En siembra directa, apricar el producto después de la siembra de arroz
-En tembra directa, apricar el producto después de la siembra de arroz
-En tempotaria, oplicar la dosse recomendada de BUONAPRIOZ 60% CE de 1 a 4 dias después de realizado el transplante, antes que las malezas

Aplicar BUONAPROZ 60% CE (a Butachtor) una aplicación por campaña, como máxemo PERIODO DE REMINIRESE. D'usebs reingresar al campo 34 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de complicto este periodo, debará user aque por de protección. COMPATIBILIDAD: BUONARROZ 60% CE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad

FITOTOXICIDAD; BUONARROZ 60% CE no es fitolóxico en los culivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiquela

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la atiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas





LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO











TRIPLE LAVADO

Envase PEAD

néagrum

LOGO NEOAGRUM PANT. 343 C PANT. 377 C PANT. 1375 C

TRIPLE LAVADO TEXTO **B.TOXICOLOGICA** NEGRO PANT. 293 C

LOGO PRODUCTO P. INFLAMABLE

PANT. 3285



CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

2.2 cm

1.0 ± 0.3