



ETIQUETA

BUONARROZ 60% CE - SINOCHEM AGRO CO.LTD.

Revisión: 00
Aprobado: JR
Fecha: 14-07-16
Página: 5 de 6

48.0 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.3

1.0 ± 0.3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Peligroso si se inhalado. Evite respirar la nebulación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicamentos, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezclas y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Cloracetamida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. De continuar con el problema, consulte a un médico.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada, lavar con abundante agua.
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado a persona afectada a un lugar ventilado. Aplicar respiración artificial de ser necesario. Consulte a un médico.
- NOTA AL MEDICO: No posee antídoto, el tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 322 7700 NEOAGRUM SAC: 617- 6400
ESSALUD: 0801-10200 (LÍNEA GRATUITA) CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilizado perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estancos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranjes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.

BUONARROZ 60% CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Butachlor..... 600 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

PQUA N°

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



PJ Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-8400

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SINOCHEM AGRO CO., LTD.
17-19 th Floor, N°33, Hengan Road(S)
Shanghai - CHINA

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BUONARROZ 60% CE es un herbicida líquido, recomendado en aplicaciones preemergentes de malezas en el cultivo del arroz. Se recomienda para el control de malezas gramíneas, ciperáceas y algues de hoja ancha, en siembras de transplante. Antes de usar el producto, agítelo bien el envase cerrado BUONARROZ 60% CE es fácil de preparar, basta verificar la dosis recomendada en agua que permita obtener una emulsión uniforme, luego se completa con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación de acuerdo a la calibración y siempre agitando a efecto de mantener la emulsión.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Table with 5 columns: CULTIVO, Nombre Común, Nombre Científico, DOSIS L/ha, P.C. (días), L.M.R. (ppm). Rows include Arroz with various weed names like Rabo de zorro, Cebadilla, Moco de pavo, Verdolaga, Pata de gallina, Cadillo, Yuyo o bleado, Coquito.

PC Período de carencia (días) NA No aplica LMR Límites máximos de residuos (ppm partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda

- En siembra directa, aplicar el producto después de la siembra de arroz.
- En transplante, aplicar la dosis recomendada de BUONARROZ 60% CE de 1 a 4 días después de realizado el transplante, antes que las malezas hayan emergido.
- Aplicar BUONARROZ 60% CE (1 a Butachlor) una aplicación por campaña, como máximo.

PERÍODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes del cumplimiento de este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: BUONARROZ 60% CE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: BUONARROZ 60% CE no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Color calibration chart with labels: TRIPLE LAVADO LOGO NEOAGRUM, TRIPLE LAVADO B.TOXICOLÓGICA, LOGO PRODUCTO, P. INFLAMABLE, Envase PEAD, PANT. 343 C, PANT. 377 C, PANT. 1375 C, NEGRO, PANT. 293 C, PANT. 3285, PANT. ROJO (M-100, Y-100)

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSG del GRUPO SILVESTRE

10012